

Научный редактор — Игорь Рубель, ветеринарный врач клиники «Оберег»  
(г. Москва), автор ветеринарного блога @dr.igorrubel в Instagram



# Первая помощь **КОШКАМ**

- ОСМОТР • ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
- АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ • ЗДОРОВЬЕ • КОРМЛЕНИЕ
- ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД



Дженнифер Паркер

МИО

Первая помощь  
**КОШКАМ**



УДК 636.09:636.8

ББК 48:46.74

П18

*Научно-популярное издание  
Серия «Счастливые хвостики»*

*На русском языке публикуется впервые*

**Паркер** Дженифер

### **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ КОШКАМ**

**Осмотр, действия в экстренных ситуациях,  
аптечка первой помощи, здоровье,  
кормление, ежедневный уход**

Перевод с английского Татьяны Землеруб

Научный редактор Игорь Рубель

Руководитель редакционной группы *Ольга Киселева*

Ответственный редактор *Ирина Ксендзова*

Литературный редактор *Елена Гурьева*

Арт-директор *Яна Паламарчук*

Верстка обложки *Александра Селезнева*

Верстка *Надежда Кудрякова*

Корректоры *Елена Гурьева, Екатерина Тупицына*

В оформлении обложки использовано  
изображение по лицензии shutterstock.com  
(Gladskikh Tatiana).

Подписано в печать 20.09.2021.

Формат 70×100 1/16. Гарнитура Myriad Pro.

Усл. печ. л. 15,56. Тираж 2500 экз.

Импортер: ООО «Манн, Иванов и Фербер»

123104, Россия, г. Москва, Б. Козихинский пер., д. 7, стр. 2

[mann-ivanov-ferber.ru](http://mann-ivanov-ferber.ru)

[facebook.com/miftvorchestvo](https://facebook.com/miftvorchestvo)

[vk.com/miftvorchestvo](https://vk.com/miftvorchestvo)

[instagram.com/miftvorchestvo](https://instagram.com/miftvorchestvo)

Отпечатано в Китае

Original title: First Aid for Cats


© 2020 Quarto Publishing plc

© Издание на русском языке, перевод, оформление.

ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2022

*Все права защищены. Никакая часть данной книги  
не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме  
без письменного разрешения владельцев авторских прав.*

ISBN 978-5-00195-009-7



Серия «Счастливые хвостики»

Дженнифер Паркер

# Первая помощь **КОШКАМ**

Осмотр, действия в экстренных ситуациях,  
аптечка первой помощи, здоровье,  
кормление, ежедневный уход



Москва  
«Манн, Иванов и Фербер»  
2022

# СОДЕРЖАНИЕ

Подробнее о книге	6
Как пользоваться этой книгой	8

## 1

### ЗДОРОВАЯ КОШКА

Анатомия	12
Здоровье зубов	18
Стрижка когтей	24
Вакцинация	26
Интеллектуальная стимуляция	28
Как понять кошку	32
Дрессировка	36
Питание	38
Паразиты	46
Пожилые кошки	50
Почему кошка не ест?	54

## 2

### БАЗОВАЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И УХОД


Как осмотреть кошку	58
Когда нужно обращаться к ветеринару	62
Аптечка первой помощи	66
Как вести себя с травмированной кошкой	70
Обработка и перевязка неглубоких ран	76
Проблемы с шерстью	78
Проблемы с глазами	80
Что делать, если кошка где-то застряла	82
Послеоперационный уход	84
Уход за ранами после операции	86
Как дать кошке лекарство	88
Как помыть кошку лечебным шампунем	98
Как определить беременность	102
Как обеспечить безопасность кошки в чрезвычайной ситуации	104



# 3

## ЭКСТРЕННАЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Как определить, испытывает ли кошка боль	112
Состояние шока	116
Удушье	118
Реанимационные мероприятия	122
Переломы	126
Тепловой удар	128
Абсцессы	129
Ожоги	130
Укусы животных и насекомых	132
Травмы, полученные в драке	134
Травмы в результате ДТП и прочие	138
Проблемы с мочеиспусканием	144
Утопление	146
Удар электрическим током	148
Лихорадка	150
Рвота	152
Диарея	153
Судороги	154
Паралич	156
Отравление	158
Беременность	162
Уход за новорожденными котятами	168
Реанимация новорожденного котенка	170
Как сделать ветеринарный воротник	172
Как сделать переноску	174
Вопросы и ответы	176



# 4

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Классификатор травм и болезней	184
Глоссарий	186
Алфавитный указатель	188
Благодарности	191
Источники иллюстраций	192



# ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ

Перед вами руководство по оказанию первой помощи кошкам, изучив которое вы узнаете, как лучше всего поступить в случае возникновения медицинской проблемы — от небольшой царапины до происшествия с угрозой для жизни. Вы познакомитесь с основными принципами оказания первой помощи кошкам и способами предотвращения травм. Держите книгу рядом с аптечкой первой помощи для кошки на случай, если вам придется заглянуть в нее в чрезвычайной ситуации.

Кошки любопытны, и это далеко не всегда идет им на пользу, иногда это качество доставляет немало неприятностей. Рано или поздно кошка может получить травму или заболеть. Бывают случаи, когда вы не знаете, как лучше поступить. Эта книга поможет вам взять правильный курс в неопределенной ситуации. Просто откройте соответствующий раздел и найдите пошаговый сценарий действий.

Помимо первой помощи, мы расскажем о поддержании здоровья кошек. Вы найдете разделы с советами по питанию, назначению лекарств и спасению кошки из труднодоступных мест. Эта книга необходима в библиотеке всех владельцев кошек.

**Справа:** прочитайте эту книгу и узнайте, как действовать в ситуациях, требующих оказания первой помощи, чтобы у кошки было больше шансов поправиться.




**Выше:** часто после оказания первой помощи состояние кошки стабилизируется, однако ситуация может ухудшиться; если вы сомневаетесь, отвезите кошку в ветеринарную клинику.





**Слева:** необходимо регулярно проверять здоровье кошки, чтобы не упустить проблему на стадии возникновения.



## ЧТО ТАКОЕ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

В этой книге «первой помощью» мы называем помощь пострадавшей или заболевшей кошке в экстренной ситуации. Не забывайте, что в большинстве случаев первая помощь — это действия для стабилизации состояния кошки перед тем, как отвезти ее в ветеринарную клинику. Если вы не знаете, нужна ли кошке медицинская помощь, лучше перестраховаться и показать ее ветеринару.

Говоря о животных, мы используем термин «признаки», то есть то, что вы, как человек, оказывающий первую помощь, видите, чувствуете по запаху и на ощупь или слышите. Мы не используем термин «симптомы», поскольку он относится к тому, что чувствует пациент. Наши пациенты не умеют говорить, поэтому мы точно не знаем, что они чувствуют.

**Выше:** с раннего возраста приучайте кошку к проверкам на наличие признаков травмы или болезни.

# КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ


В первой части даны общие советы о том, как поддерживать здоровье кошки. Здесь вы найдете информацию о регулярных процедурах, выборе рациона, поддержании формы у кошки, профилактики паразитов, уходе за пожилой кошкой и другие советы, следуя которым вы обеспечите животному здоровую и счастливую жизнь.

Научиться действовать в ситуации, где необходима первая помощь, можно, прочитав вторую часть.

Схемы и картинки помогут разобраться с уникальными аспектами кошачьей анатомии

Полезно изучить основы анатомии кошек, чтобы лучше понимать, как работают их организм и что делать, чтобы они были здоровы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Здесь дана ключевая информация о том, как сохранить здоровье котенка или взрослой кошки дома



Вы узнаете, почему у кошек возникают те или иные проблемы со здоровьем и как их решать

В специальных информационных блоках содержится дополнительная информация об отдельных проблемах

Часто возникающие ситуации разбираются по частям и очень подробно, чтобы вы знали, на что обратить внимание







ЗДОРОВАЯ  
КОШКА

# АНАТОМИЯ


Организм кошек работает совсем не так, как у людей, и даже не так, как у собак. Вопреки расхожему мнению, кошка — это не маленькая собака! Конечно, существуют разные породы кошек, и у каждой имеются присущие только ей черты, но в целом анатомия кошек, как правило, одинакова, независимо от породы. Чтобы понимать, здорова ли ваша кошка, важно знать основные анатомические характеристики кошек.

## СКЕЛЕТ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ




Лопатки не имеют костного сочленения с грудной клеткой/туловищем и держатся на мышечной ткани. Ключица уменьшена и находится в сухожилии одной из мышц предплечья, именно поэтому кошки пролезают в любое отверстие, куда могут просунуть голову.

У кошек по пять пальцев на передних лапах и по четыре — на задних. Пятый коготь на передней лапе является рудиментарным и находится выше, чем другие. Кошка выпускает когти во время драки или лазания, а также при «топтании лапами» — поведении, характерном для расслабленного состояния.

Кошки ходят на пальцах, ступая задними лапами почти в след передним. Такая поступь означает, что при ходьбе кошка сначала переставляет две лапы с одной стороны тела, а затем — две с другой.



## КОШАЧЬИ КОГТИ



**Слева:** скелет кошки состоит примерно из 240 костей и условно делится на пять основных отделов: череп, позвоночник, ребра, передние и задние лапы.

**Выше и сверху слева:** на задних лапах у кошек по четыре пальца с выпускающимися когтями, а на передних — по пять из-за дополнительного рудиментарного.


## ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Череп кошки имеет необычную форму: у него очень большие глазницы и челюсть, приспособленная для поедания мелких млекопитающих. Кошки — плотоядные животные, и для здоровья им необходимо большое количество мяса в рационе. Особое устройство почек позволяет им обходиться малым количеством воды.



Пищеварительная система кошек значительно отличается от собачьей. У них острые зубы, характерные для хищников, и шероховатый язык, что позволяет им комфортно поедать мясо. В дикой природе мясо составляет большую часть рациона кошек или весь их рацион, поэтому ротовая полость кошки не приспособлена для употребления углеводов. Животное не чувствует сладость и плохо переваривает лактозу.

**Выше справа:** у кошек острые зубы и шершавый язык, благодаря чему они легко поедают мясо.

**Ниже:** череп кошки уникален и хорошо приспособлен для охоты, поскольку имеет большие глазницы и широко открывающуюся челюсть.



## ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОШЕК




Пищеварительный тракт кошек короткий, благодаря чему они остаются быстрыми и легкими и могут эффективнее охотиться. Для кошек очень важно усваивать большое количество белка и получать витамины и минералы именно из животной пищи, поскольку, в отличие от других млекопитающих, они не умеют синтезировать их сами. По этой причине кошек относят к облигатным хищникам, которые не выживут, питаясь только растительной едой.

Кошки не переваривают шерсть, которую заглатывают при вылизывании. Избавляясь от нее, ваша кошка периодически срыгивает «шерстяные комочки».



**Выше:** с раннего возраста кошки инстинктивно учатся охотиться на добычу; в дикой природе их рацион в основном составляют мелкие млекопитающие и птицы.




**Слева:** поскольку рацион кошек состоит в основном из мяса, пищеварительный тракт у них короткий и выглядит совсем иначе, чем у собак или людей.

## ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Большие уши кошек обращены вверх, благодаря чему у них отличный слух. Кошки способны двигать каждым ухом в отдельности, что дает им некоторую степень направленного слуха. Немалую роль уши играют и в общении (см. с. 32).

Решающее значение для кошачьей коммуникации имеет нос, поскольку кошки «разговаривают» посредством запахов и более чувствительны к ним, чем люди. Благодаря яacobсонову органу в верхней части рта они прекрасно распознают запахи.

**Ниже:** зрачки у кошек могут сильно расширяться, что позволяет им охотиться в сумерках.



СТЕПЕНЬ РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА У КОШЕК



Узкий



Наполовину расширенный



Полностью расширенный



**Слева:** хвост поддерживает баланс тела и служит средством общения. Например, подергиванием хвоста кошка сообщает о раздражении, а изогнутый кончик — знак приветствия.



**Выше:** направленный слух, отличное обоняние, длинные усы и глаза, адаптированные к сумеркам, сделали кошек непревзойденными охотниками.

С помощью усов кошка определяет положение предметов и движение воздуха; усы крайне чувствительны к касанию. Их длина соответствует половине ширины туловища кошки, что помогает ей определять, пройдет ли она между предметами.

Хвост — еще один полезный инструмент общения, хотя его основная функция заключается в поддержке равновесия.

Кошки хорошо видят в полумраке: их зрачки сильно расширяются, а слой клеток сетчатки, обратно отражающих свет, достаточно тонкий. В дикой природе кошки активны на рассвете и в сумерках, и особое устройство глаз помогает им ловить добычу в условиях низкой освещенности.

## ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

У самок длинное, тонкое влагалище, анус расположен над ним, что напоминает точку с запятой (;). У самцов под анусом — два маленьких яичка. Пенис находится ниже яичек и покрыт чешуйками-шипиками, которые стимулируют овуляцию, когда самец вынимает пенис из влагалища во время спаривания.

## КОЖА

У кошек довольно складчатая кожа. Свободнее всего она прилегает вокруг задней части шеи, на загривке, за который кошка-мать переносит котят. У некоторых кошек есть участок складчатой кожи на животе, своего рода «подушка безопасности» во время драк, а также дополнительное пространство, чтобы желудок расширился при большом количестве пищи.



Обычно у кошек на коже складки

Яички некастрированного кота

**Выше:** складки на коже в некоторых местах — это биологическая адаптация, в том числе для защиты во время драк и для переноски котят.

## ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

Чтобы охладить организм, кошки испаряют влагу изо рта. В отличие от людей, они почти не потеют. Кроме того, они не приспособлены часто дышать, чтобы снизить температуру, и делают это только при сильном перегреве. Кошки также охлаждаются, вылизывая шерсть: влага испаряется, что работает подобно потоотделению.



**Выше:** кошка-мать держит своего котенка «за шкирку», то есть за складки кожи на загривке.

# ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ


Поддержание здоровья зубов — важный аспект заботы о животном. Регулярно проверяйте кошке зубы и начинайте чистить их как можно раньше.

## ОБЩАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Как и у людей, у кошек бывают стоматологические болезни, поэтому важно следить за здоровьем зубов кошки. Чистка зубов лучше всего помогает укрепить десны, а также предотвратить накопление зубного налета и последующие проблемы со здоровьем: отложение зубного камня, инфекции, абсцессы и неприятный запах изо рта.

Необходимо ежегодно показывать кошку ветеринару для проверки состояния полости рта. После проверки ветеринар может предложить чистку зубов, которая проводится под наркозом и может включать рентген. Это стандартная практика, поскольку у кошек болезни зубов часто начинаются под деснами, что вызывает болезненные повреждения и приводит к удалению зубов.

**Справа:** регулярно проверяйте зубы кошки, чтобы на ранних этапах заметить отложение зубного налета или признаки стоматологических заболеваний.





## ЧИСТКА ЗУБОВ


Не все кошки позволяют чистить им зубы, но если у вас получится, то это поможет сохранить здоровье зубов.

Если у вас молодая кошка, она быстро привыкнет к этой процедуре. Попросите ветеринара показать, как чистить зубы кошке в домашних условиях. Рекомендуется делать это каждый день в одно и то же время. Вам понадобятся специальные зубная щетка и паста для кошек.

Нельзя чистить кошке зубы пастой для людей: в ней содержатся химические вещества, которые могут быть опасны для животных, тем более что кошка, в отличие от человека, проглатывает пасту. Кроме того, кошкам не нравится вкус зубной пасты для людей. Кошачья зубная паста имеет приятный для кошек запах.

**Выше:** кошачьи зубные щетки бывают разных форм и размеров, в том числе с изогнутой ручкой и надевающиеся на палец.

**Справа:** приучать кошку к чистке зубов нужно постепенно и начинать лучше, когда кошка еще молодая.



Выбирая зубную щетку, ищите небольшую, с мягкой щетиной. Есть резиновые зубные щетки, надевающиеся на палец, но будьте осторожны, чтобы кошка вас не укусила. Если кошек несколько, у них должны быть отдельные щетки, чтобы избежать распространения инфекции.




## КАК ЧИСТИТЬ ЗУБЫ КОШКЕ


Приучать кошку к чистке зубов нужно постепенно, не торопя события. Кошка привыкнет к прикосновениям во рту, если выполнять следующие действия:

**1** В течение нескольких дней берите немного пасты на палец и давайте кошке ее понюхать.

**2** Потренируйтесь держать голову кошки неподвижно, когда она сонная.




3



4

**3** Держите кошку так, чтобы она была спиной к вашей груди, а ладонь положите ей на затылок.

**4** Большим и указательным пальцами держите голову кошки за скулы. Аккуратным, но уверенным движением запрокиньте ей голову.



5



6

**5** Большим пальцем осторожно приподнимите кошке верхнюю губу.

**6** Другой рукой аккуратно опустите нижнюю губу, чтобы было видно зубы.

**ВАЖНО**

Здорово, если у вас будет помощник, который подержит кошку за лапы.

Если вы планируете проводить процедуру в одиночестве, а кошка вырывается, попробуйте завернуть ее в полотенце.

Десны кошки могут немного кровоточить после первой пары чисток, но это прекратится, когда процедура станет регулярной.




**7** В течение последующих нескольких дней потренируйтесь держать кошку подобным образом, но теперь наносите пасту ей на зубы с помощью ватного тампона, начиная с задней части рта.

**КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ**

● ----- ●  
**Как только кошка привыкнет к процессу, начинайте пользоваться зубной щеткой:**

**1** Нанесите немного зубной пасты на обычную щетку или щетку, надетую на палец.



**2** Потрите зубы щеткой круговыми движениями.



**3** Начинайте с задних зубов, постепенно двигаясь к передним.

**4** Увеличивайте время чистки и постепенно доведите его до 40 секунд с каждой стороны.



**Дальше слева:** жевательные игрушки и лакомства в качестве дополнения к чистке помогают уменьшить образование зубного налета.

**Слева:** ополаскиватель для рта можно приобрести в зоомагазинах и ветеринарных клиниках.

**Ниже слева:** наличие сухого корма в рационе полезно для гигиены зубов кошки.

## АЛЬТЕРНАТИВЫ ЧИСТКЕ ЩЕТКОЙ

Если кошка не переносит процесс чистки зубов, есть другие способы сохранить ее зубы здоровыми. Важный фактор — это рацион. С точки зрения здоровья зубов полезен переход с влажного корма на сухой или их смесь. Однако прежде чем менять рацион, следует проконсультироваться с ветеринаром, поскольку эти изменения могут негативно сказаться на других аспектах здоровья.

Можно купить жевательные игрушки и лакомства для кошек. Они помогают уменьшить образование зубного налета, хотя и не так эффективны, как чистка.




## КАК ОПОЛАСКИВАТЬ КОШКЕ РОТ

**В зоомагазинах и ветеринарных клиниках можно найти ополаскиватели на основе хлоргексидина, которые полезны для гигиены полости рта.**


Ополаскивать рот нужно ежедневно после каждого приема пищи или исходя из рекомендаций ветеринара.

- 1** Аккуратно поднимите верхнюю губу, чтобы видеть зубы и десны (см. с. 20).
- 2** Средства для полоскания продаются в бутылочке с насадкой. Аккуратно ведите струю вдоль линии десен. Жидкость для ополаскивания рта на основе хлоргексидина быстро распределяется и полностью покрывает всю ротовую полость, включая труднодоступные участки.

**Справа:** при несоблюдении графика гигиенических процедур полости рта у кошек могут развиваться заболевания, например хронический язвенный парадентальный стоматит (CUPS).



**Слева:** болезни ротовой полости у кошек опасны. В случае изменений, например сильного слюноотделения, обратитесь к ветеринару.



**Ниже:** зубные сколы и выпадение зубов распространены у кошек и требуют внимания ветеринарного врача.



## КОГДА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ВЕТЕРИНАРУ

Следует ежемесячно осматривать ротовую полость кошки, чтобы убедиться, что проблем с зубами или деснами нет. В ветеринарную клинику необходимо обратиться, если вы заметили один из следующих признаков:

- подтекание слюны;
- неприятный запах изо рта;
- абсцессы, или гнояники;
- красные, опухшие или кровоточащие десны;
- боль при приеме пищи;
- потеря аппетита;
- частое касание лапой рта;
- качающиеся или сломанные зубы, сколы или выпадение зубов;
- сыпь;
- кровь в слюне или выделения из носа.

# СТРИЖКА КОГТЕЙ

Если ваша кошка гуляет на улице, то стричь ей когти не нужно: они необходимы ей для лазания и защиты. Кошки бегают и лазают по шероховатым поверхностям, и когти не должны вращаться.



Однако если кошка домашняя, то может появиться необходимость подстричь ей когти. Дома животные дерут мебель и царапают владельцев. У пожилых кошек когти могут вращаться, что приводит к болезненным ощущениям и инфекции.


Если вы считаете, что кошке необходимо подстричь когти, лучше сначала посетить ветеринарную клинику, чтобы вам показали безопасный метод. Если у вас не получается, попросите ветеринара подстричь когти вашей кошке.

**Слева и справа:**  
когтеточка — хороший способ позволить кошке вести себя естественно без ущерба для мебели, особенно если животное постоянно находится только в помещении.



## ВАЖНО

Молодым кошкам достаточно обрезать когти только на передних лапах, но если ваше животное уже немолодо, то стоит подрезать когти и на задних.




## КАК ПРАВИЛЬНО СТРИЧЬ КОГТИ КОШКЕ

Чтобы подстричь когти кошке самостоятельно, сделайте следующее:


**1** Подождите, пока кошка успокоится или начнет засыпать.

**2** Выберите хорошо освещенное помещение.


**3** Посадите кошку на колени мордой от себя.



**4** Если кошка не сидит смирно, заверните ее в полотенце, оставив торчать одну лапу.



**5** Выпускайте каждый коготь по очереди: осторожно сожмите палец сверху и снизу, чтобы коготь показался наружу.



**6** Будьте внимательны: не заденьте кровеносный сосуд ногтевой пластины, проходящий через середину когтя. Возьмите кусачки или ножницы для стрижки когтей и срежьте только небольшую часть прозрачного кончика.



**7** Если кошка нервничает или боится, сделайте перерыв и повторите попытку в другой раз.


# ВАКЦИНАЦИЯ

Прививки — это реальная возможность защитить кошку от серьезных, иногда смертельных болезней. Научно доказано, что основные прививки, которые делают в ветеринарных клиниках, необходимы для здоровья кошки.

Котят прививают от распространенных заболеваний в возрасте около 9 недель и повторно в 12 недель. После первичных прививок вакцинацию необходимо повторять раз в год. Если вы никогда или более 15 месяцев не делали кошке прививок, необходимо обсудить с ветеринаром, какие прививки ей нужны.

Первые прививки обеспечат защиту кошке от кошачьего инфекционного энтерита, кошачьего герпесвируса, кошачьего калицивируса, кошачьего хламидиоза, вируса лейкемии у кошек и бешенства. Не выпускайте котенка из дома в течение десяти дней после второго этапа прививок.

**Ниже:** взрослых кошек необходимо показывать ветеринару для назначения вакцинации раз в год после первичных прививок в возрасте 9 и 12 недель.





**Слева:** чаще всего котят до 12 недель прививают от шести самых серьезных инфекций, после чего в течение жизни делают повторные прививки.

**Ниже:** в некоторых странах, например входящих в ЕС, необходим официальный паспорт питомца; в США выдают справки в зависимости от страны назначения, а также контролируют прививку от бешенства\*.

## РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВАКЦИНАЦИЕЙ

Риски, связанные с вакцинацией кошек, очень малы, а преимущества перевешивают вероятность возникновения проблем. В редких случаях (обычно когда у кошки уже есть заболевание) прививка может вызвать отек в месте инъекции и иммунные заболевания.

Если вы заметили, что кошка плохо себя чувствует после прививки, например у нее появились признаки слабости, лихорадка, рвота или диарея, необходимо отвезти ее в ветеринарную клинику.



## ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

Если вы везете кошку за границу, для получения паспорта домашнего животного, запрашиваемого в некоторых странах, могут потребоваться дополнительные прививки. Посетите ветеринарную клинику хотя бы за полгода до запланированной поездки, чтобы у вас было время их сделать.

\* В РФ считается обязательной только вакцинация от бешенства. Ветеринарный паспорт и вакцинация от других инфекций рекомендуются. *Прим. науч. ред.*

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

Как и людям, кошкам полезна стимуляция умственного развития. Особенно это важно для домашних кошек, у которых нет возможности вести себя так, как им положено в естественной среде.

В дикой природе кошки сами добывают себе пищу и большую часть времени охотятся. Это очень отличается от их «одомашненного» образа жизни, когда им подают готовую еду в миске 2–3 раза в день. Как же обеспечить необходимую интеллектуальную стимуляцию, если ваша кошка не играет на улице? Уберечь любопытных кошек от неприятностей можно с помощью простых умственных задач.



**Слева:** полезно превратить прием пищи в «охоту», особенно если кошка не выходит на улицу.



**Выше:** кормушки-головоломки — отличный способ обеспечить кошке интеллектуальную стимуляцию и имитацию естественного поведения.

## ИГРА В ОХОТУ


Игра с добычей, возможно, лучший способ стимуляции. Для начала попробуйте просто перемещать миску с кошачьей едой и кормить кошку в разных местах, заставляя ее «охотиться», следуя естественным инстинктам.



## КАК СДЕЛАТЬ КОРМУШКУ-ГОЛОВОЛОМКУ

Можно заставить кошку потрудиться, чтобы добыть еду, если спрятать сухой корм в кормушке-головоломке. Разные варианты продаются в зоомагазинах, но их можно изготовить и своими руками.

**Справа:** в зоомагазинах продаются различные кормушки-головоломки, откуда нужно добыть сухой корм.



**1** Положите корм в трубочку из-под туалетной бумаги и прорежьте в ней отверстия так, чтобы в них проходили кусочки пищи.

**2** Заделайте концы трубочки и дайте ее кошке. Она станет играть с кормушкой, пока не вытащит всю еду.

### ВАЖНО

Можно сделать похожие игрушки, поместив кусочки сухого корма в контейнеры, чтобы кошке пришлось доставать их лапой.

## НАЗАД К ИСТОКАМ

Картонная коробка — лучший друг кошки: это не только развлечение, но и подспорье для вас, поскольку там можно спрятать еду. Скорее всего, кошка сама найдет способ играть с коробкой, но если ей нужна помощь, положите внутрь игрушку или с помощью игрушки-палочки с перьями или чем-то еще заставьте ее прыгать в коробку и обратно. Не забывайте, что в итоге кошка должна поймать игрушку. Если она охотится, но не может поймать добычу, она перестает получать удовольствие!

Можно использовать лазерную указку: это тоже хороший способ поиграть с кошкой и заставить ее двигаться. Следите, чтобы не попасть лучом ей в глаза. В конце игры дайте ей другую игрушку или лакомство: что-то осязаемое, что можно поймать (в отличие от игры с указкой).



**Выше:** кошки всегда с удовольствием охотятся за лучом лазерной указки. Это недорого и заставит их двигаться без особых усилий с вашей стороны.

**Слева:** простая картонная коробка может надолго занять кошку. Это отличный способ обеспечить ей игровую активность в домашних условиях.

## КАК НАУЧИТЬ КОШКУ НОВЫМ ТРЮКАМ

Можно научить кошку выполнять команды и даже приносить предметы. Вопреки распространенному мнению, кошки так же способны к обучению, как собаки: они умны и учатся сидеть или переворачиваться за угощение или похвалу.

Можно использовать лакомство, чтобы научить кошку приносить игрушку (или комочек бумаги). На с. 36 есть советы по дрессировке кошек.

Когтеточка, особенно многоуровневая, с домиком, где можно спрятаться, отлично стимулирует игру. Если у вас есть подобная когтеточка-дерево, но кошка перестала с ней играть, переставьте ее в другое место в квартире. Кошка воспримет ее как новую игрушку и снова проявит интерес.

Такие игры не только полезны для самочувствия кошки, но и помогают ей оставаться в форме и дают возможность совместного времяпрепровождения.



**Слева:** игра заставляет кошку больше двигаться и стимулирует ее интеллект; кроме того, это один из способов общения с хозяином.



**Выше:** полезная вещь для улучшения среды обитания кошки — многоуровневая когтеточка, где кошка может лазать, играть и прятаться.



# КАК ПОНЯТЬ КОШКУ

Часто владельцы расстраиваются из-за неспособности общаться с кошкой. У кошек широкий спектр эмоций, и если вы научитесь их считывать, то начнете лучше понимать своего питомца. К счастью, многое можно почерпнуть из языка тела кошки.



СПОКОЙНАЯ КОШКА

## СПОКОЙНОЕ СОСТОЯНИЕ

Как узнать, что кошка в хорошем настроении? Независимо от позы, в хорошем настроении она спокойна. В положении стоя кошка выглядит естественно, хвост либо неподвижен, либо поднят с чуть загнутым кончиком. Стоит кошка, лежит или сидит, в спокойном состоянии уши у нее находятся в естественном положении: расположены вертикально, смотрят вперед (но если кошка прислушивается, она может двигать ушами). При этом животное медленно моргает или держит глаза полузакрытыми; усы расслаблены. Если кошка лежит, она может показать живот или вытянуться. Сидя, она излучает состояние комфорта, хвост не прижат к туловищу.

## ТРЕВОГА

Когда кошку что-то беспокоит, она прячется. Если кошка сидит, напряженно съежившись, это говорит о том, что она тревожится. Она будет шевелить ушами, или уши будут повернуты в стороны, голова опущена и прижата к телу; глаза открыты, зрачки расширены. В состоянии тревоги кошка поджимает хвост и сидит, не меняя позы. Иногда кончик хвоста медленно двигается из стороны в сторону.




КОШКА В СОСТОЯНИИ ТРЕВОГИ

ИСПУГАННАЯ КОШКА



ЗЛАЯ КОШКА



## ИСПУГ

Внешние признаки кошачьего испуга распознать гораздо легче, чем признаки беспокойства. Испугавшись, кошка может убежать, встать или прижаться книзу, затаившись.

Она издает звуки, например шипит или рычит, или атакует угрозу. Поза будет настороженной. Когда кошке страшно, она пытается выглядеть больше, выгнув спину, подняв шерсть дыбом и ошетилив усы (или прижав их к морде). Хвост подвернут под туловище или энергично двигается из стороны в сторону. Глаза кошки широко открыты и не мигают, зрачки полностью расширены, уши прижаты к голове или развернуты назад.

## ЗЛОСТЬ

Признаки злости и страха у кошек отличаются, и важно уметь их распознавать, чтобы правильно реагировать. Если вы заметили, что кошка злится,


лучше к ней не приближаться. Не пытайтесь успокоить ее или спровоцировать, просто держитесь подальше, пока она сама не успокоится. Если кошка злится, она, как правило, напряжена. Пытаясь казаться больше, она выгибает спину, выпрямляет передние лапы и поднимает шерсть дыбом. Кошка сидит скрючившись или стоит; хвост поджат или поднят вертикально. Глаза широко открыты и не мигают, но зрачки могут быть сужены. Взгляд кажется сфокусированным. Уши повернуты назад и прижаты к голове, усы сильно топорщатся в стороны. Когда кошка злится, она может издавать звуки, например шипеть, фыркать или рычать, но далеко не всегда — она также может вести себя тихо и быть напряженно-сосредоточенной.

## КАК ТРАКТОВАТЬ КОШАЧЬИ ЗВУКИ

Взрослые кошки не мяукают другим кошкам (это делают только котята, общаясь с матерью). Мяуканье стало скорее средством общения домашних кошек с людьми.

Вы наверняка замечали, что ваша кошка мяукает по-разному: разные «мяу» передают разные значения. Одни кошки издают больше звуков, чем другие, и их количество может меняться на протяжении жизни. Независимо от того, как часто кошка издает звуки, полезно уметь интерпретировать ее «речь».

**ПРИВЛЕКАЮ  
ВНИМАНИЕ.**



**ПРОШУ ЕДУ.**

### Обычное мяуканье

Чаще всего кошки мяукают именно так. Это «мяу» средней длины среднего тона по высоте. Обычно такими звуками кошка чего-то просит. Как правило, из контекста можно понять, чего именно. Часто кошки просят еду или чтобы их выпустили на улицу.

### Короткое, быстрое мяуканье

Это приветствие, так кошка с вами здоровается.

### Многократное мяуканье

Несколько «мяу» подряд обычно означают, что кошка взволнована или хочет внимания.

### Длинное, протяжное мяуканье

Как и в случае с обычным мяуканьем, более длинные и протяжные звуки означают, что кошка чего-то хочет. Возможно, это знак, что пришло время завтракать или ужинать.

### Пронзительное мяуканье

Если кошка мяукает более высоким тоном, чем обычно, возможно, она испугалась или ей больно.

### Мяуканье басом

Если кошка мяукает более низким тоном, чем обычно, это может быть жалоба. Так кошка ворчит, что вы не сделали того, чего она хотела от вас.

### Рычание, шипение или фырканье

Если вы слышите, что кошка рычит, шипит или фыркает, значит, она злится или боится.

Шипение — это предупреждение о нападении, и часто кошки шипят на других животных. Если кошка рычит, шипит или фыркает, когда вы приближаетесь к ней, вероятно, ей больно и нужно отвезти ее к ветеринару.

### Урчание

Если кошка мурлычет, значит, она спокойна и у нее все хорошо. Урчание — признак расслабленного состояния. Правда, бывает и наоборот: кошка мурлычет, когда ей больно или она плохо себя чувствует. Если вы заметили, что кошка мурлычет в необычной ситуации, например когда просто сидит скукожившись в одиночестве, это повод отнести ее к ветеринару.

ЖАЛУЮСЬ.




### Вой

Иногда кошки воют или стонут, издавая звук, известный как «кошачий вой». Это безошибочный признак того, что кошка-самка находится в периоде течки и хочет сообщить об этом самцам. У животных обоих полов такие звуки также могут быть одним из ранних признаков слабоумия.

### Попискивание и вибрирующий звук

Звук, напоминающий попискивание, меньше распространен среди кошек, чем мяуканье, и его точное значение неизвестно. Возможно, так кошки просят вас следовать за ними или просто волнуются, например когда видят близости птиц или другую добычу.



ПОПИСКИВАЮ  
НА ПТИЧЕК.

# ДРЕССИРОВКА


Есть много способов дрессировать кошек. Лучше всего обучать котят. Оптимальный период для дрессировки — возраст от 8 до 13 недель.

Первое, что нужно учитывать, обучая маленького котенка, — это развитие его социальных навыков. Ему важно вступать в контакт с большим количеством разных людей, включая детей. На этом этапе можно приучить котенка находиться в переноске или ездить в машине.

Как только кошка усвоила основные социальные навыки, начинайте обучение другим вещам. Дрессировать кошек можно в любом возрасте, но более молодые животные учатся быстрее. Кошка способна научиться выполнять разнообразные действия: от распознавания своего имени до использования лотка и когтеточки. Основные принципы обучения одни и те же, какова бы ни была конечная цель. Помните, что кошки не реагируют на отрицательное подкрепление, поэтому всегда используйте положительное.



**Выше и ниже:** легче всего научить кошек пользоваться лотком или сидеть в переноске в раннем возрасте.



ПРИУЧЕНИЕ К ЛОТКУ

## ВАЖНО

Не забывайте, что любая дрессировка требует времени и терпения. Для обучения используйте положительное подкрепление.

Никогда не ругайте кошку! Если кошка делает что-то не так, например кусается, твердо скажите «нет» и уйдите от нее. Хвалите ее, когда она играет аккуратно. Чтобы избежать путаницы, обучайте ее одному навыку за раз и будьте последовательны при использовании сигналов и вознаграждений.

## ЭТАПЫ ДРЕССИРОВКИ КОШКИ

Кошки — разумные животные, и их можно научить выполнять команды так же, как собак. Решите, чему хотите научить кошку, и выполните следующие четыре шага.

**1** Точно определите, чему хотели бы научить кошку, и придумайте слово-сигнал. Если вы учите ее откликаться на имя, то сигналом будет имя. Если вы учите кошку сидеть, можно использовать команду «сидеть». Произносите сигнальное слово четко и ясно.

**2** Если кошка реагирует на сигнал, подкрепите действие, дав ей лакомство. Можно похвалить кошку словами и предложить подкрепление в виде внимания: погладить ее или поиграть с ней.

**3** Давать кошке лакомство каждый раз, когда произносите ее имя, не получится, поэтому полезно использовать кликер. Всякий раз, вознаграждая кошку, нажимайте на кликер. Таким образом она начнет ассоциировать звук кликера с наградой. В будущем вы сможете использовать кликер в качестве награды (давая лакомство только время от времени, а не каждый раз).

**4** Уделяйте дрессировке по 10 минут каждый день. Давайте кошке награду каждый раз, когда она реагирует на сигнал. Если вы учите кошку пользоваться когтеточкой, давайте ей награду, когда она прикасается к когтеточке (неважно, точит она когти или нет). Если вы обучаете кошку команде «лежать», для начала дайте ей лакомство, когда она сядет. Как только она научится садиться, перестаньте поощрять ее за это и награждайте, только когда она ложится.

**Выше и слева:** лучший метод дрессировки кошек — положительное подкрепление в виде внимания или еды. Со временем можно начать использовать кликер.



# ПИТАНИЕ

В поддержании здоровья кошки большую роль играет рацион. Существует множество вариантов того, чем кормить кошку. Как узнать, какой корм выбрать?

В рационе должны быть необходимые кошкам компоненты. В дикой природе кошки — облигатные хищники. Это означает, что им нужны питательные вещества, содержащиеся в продуктах животного происхождения. Кошки едят много белка, немного жира и почти не потребляют углеводы. Эти условия не менялись с тех пор, как кошки были одомашнены, и их питание должно включать ряд необходимых питательных веществ.


У котят и взрослых кошек разные потребности, поэтому кошкам нужно давать корм в зависимости от возраста. Если вы кормите котенка сухим и влажным кормом, то он с большей вероятностью будет есть и то и другое, когда станет старше. У пожилых кошек другие потребности в питании, но часто нет необходимости менять их рацион без специальной рекомендации ветеринара.

## ЧЕМ КОРМИТЬ КОШКУ?

Кошачьи корма обычно делятся на три категории: влажные, полувлажные и сухие. Все корма для домашних животных, продаваемые в супермаркетах, одобрены контролирующим органом, то есть содержат необходимые питательные элементы. Читайте состав кормов на этикетке и покупайте те, в которых мясо, море- и мясные продукты указаны в верхней части списка ингредиентов.



**КОТЕНОК  
(4 НЕДЕЛИ — 4 МЕСЯЦА)**  
Котята растут быстро, и им необходим сбалансированный рацион и небольшие, но регулярные приемы пищи. В этом случае у котенка будут здоровые глаза, блестящая шерсть, прочные кости и упругие мышцы



**МОЛОДАЯ КОШКА (1–7 ЛЕТ)**  
Молодой кошке необходим сбалансированный рацион с хорошим запасом витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, чтобы сохранять зубы, кости и глаза здоровыми, поддерживать метаболизм и обеспечивать рост



Сухой корм



Влажный корм

Комбинированное  
питание

#### ПОЖИЛАЯ КОШКА (СТАРШЕ 7 ЛЕТ)

Корм для пожилых кошек легче переваривается и содержит питательные вещества, необходимые для поддержания иммунной системы и суставов

**Слева:** рацион кошки необходимо корректировать на протяжении всей жизни с учетом определенных условий возрастной группы, а также личных предпочтений и особенностей здоровья питомца.

#### ВАЖНО

Выбор корма – сухого, влажного или полувлажного – зависит от возраста и предпочтений кошки. Одним нравится сухой корм, другим – влажный, а некоторые предпочитают их комбинацию.



**Влажный корм****Влажный корм**

Влажный корм обычно продается в банке или пауче, это хороший источник питательных веществ и воды. Кошкам он нравится на вкус и, как правило, представляет собой самый качественный вариант мяса. Влажный корм бывает различных вкусов и имеет длительный срок хранения в закрытом виде. После вскрытия его можно держать в холодильнике в течение одного-двух дней.

**Полувлажный корм**

Полувлажный корм состоит из мяса и мясных продуктов, смешанных со злаками. Он обычно дешевле влажного, но дороже сухого. Некоторые кошки предпочитают этот вариант влажному корму.

**Полувлажный корм****Сухой корм**

Сухой корм, или гранулы, представляет собой высушенные кусочки пищи; размер позволяет взять гранулу в рот целиком. Он дешевле влажных кормов и может храниться несколько месяцев до истечения срока годности. Сухой корм не так нравится кошкам и труднее переваривается. Часто он содержит больше углеводов, чем в идеальном кошачьем рационе. Такой корм следует хранить в прохладном, сухом месте в герметичном контейнере.

**Сухой корм**

**Выше, слева и ниже:** кошачий корм бывает трех основных типов; выберете ли вы один тип или их сочетание, зависит от возраста, здоровья и личных предпочтений вашей кошки.



**Жевательные  
лакомства  
для кошек**

**Выше:** чтобы кошка получала необходимые питательные вещества, нужно давать ей корм, соответствующий высоким стандартам кормов для домашних животных.

### Домашние продукты

Самостоятельно готовить кошачий корм не стоит. Процесс занимает много времени, и трудно гарантировать, что пища будет содержать необходимое для здоровья количество питательных веществ. Если вы планируете кормить кошку домашней едой, проконсультируйтесь с ветеринаром.

### Лакомства

На рынке кормов для животных представлено большое количество лакомств. Их следует давать время от времени, в рамках сбалансированного рациона: они не должны составлять более 15% потребляемых кошкой калорий.

## ПРОДУКТЫ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ КОШЕК

С точки зрения заботы о здоровье кошки лучше всего давать ей только кошачий корм. Специальные лакомства для кошек лучше, чем пища с вашего стола. И тем не менее кошка может иногда воровать или находить еду человека. Следите, чтобы ей не попались следующие продукты:

- лук и чеснок;
- сырые яйца;
- молочные продукты (включая молоко);
- виноград и изюм;
- алкоголь (и сырое тесто, которое в желудке кошки выделяет алкоголь);
- шоколад и кофеин;
- орехи макадамии;
- сахар и подсластители;
- фруктовые косточки и семечки;
- помидоры;
- грибы;
- курица с костями.

### ВАЖНО

На с. 161 рассказано, что делать, если ваша кошка съела что-то ядовитое.

У кошек часто бывает непереносимость лактозы, поэтому в качестве лакомства не стоит давать им молоко или сливки.



## ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС У КОШКИ

Многие владельцы не могут определить, когда у кошки появляется избыточный вес. Ожирение — большая проблема у этих животных, особенно пожилых. Так же, как и у людей, ожирение у кошек имеет серьезные негативные последствия для здоровья. У кошек с избыточным весом появляются проблемы с кожей и инфекции мочевыводящих путей, поскольку они перестают умываться и вылизываться. Из-за ожирения повышается риск диабета, проблем с суставами, артрита и других болезней. Как же узнать, что ваша кошка имеет избыточный вес? Один из способов — пощупать грудную клетку. Жировая прослойка на груди должна быть не толще, чем на тыльной стороне вашей ладони. Если ребра кошки прощупываются с трудом, есть вероятность избыточного веса.

Как и у людей, причиной прибавки веса является слишком большое количество пищи и недостаток физической активности. Когда кошка становится старше, метаболизм замедляется и она меньше двигается. В связи с этим необходимо изменить рацион. Важно, чтобы у кошки сохранялась оптимальная физическая нагрузка в соответствии с возрастом. Домашние кошки менее активны и с большей вероятностью набирают лишний вес.

Если вы подозреваете, что у вашей кошки избыточный вес, покажите ее ветеринару. Он проверит, есть ли у вашего питомца связанные с этим проблемы, и поможет составить план диеты.

**Выше:** ожирение — распространенная проблема у кошек, повышающая риск серьезных заболеваний.

## ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ВЕСОМ

Ветеринар сможет оценить состояние организма кошки и посоветовать, как контролировать или поддерживать вес. Дома посмотрите на свою кошку сверху, когда она стоит: есть ли у нее изгиб над бедрами (подтянутость живота) и ниже ребер? У здоровой кошки он должен присутствовать (однако у длинношерстных кошек его бывает плохо видно).



**НОРМА**



Подтянутость живота

Позвоночник и ребра можно прощупать под небольшой жировой прослойкой, но их не видно




Талия за линией ребер

Минимальная жировая прослойка



**ОЖИРЕНИЕ**



Нет подтянутости живота

Заметные жировые отложения на остальных частях тела

Позвоночник и ребра трудно прощупать



Заметная жировая складка на животе, талии не видно

Заметная жировая складка в паховой области



= Оценка физического состояния в баллах

СЛИШКОМ ХУДАЯ	НОРМАЛЬНАЯ	СЛИШКОМ ТОЛСТАЯ
<p>1</p> <p>Ребра и позвоночник видны и легко прощупываются (у короткошерстных кошек); нет явного жира; живот сильно подтянут; явно выраженные бедра</p>	<p>5</p> <p>Ребра прощупываются под небольшой жировой прослойкой; заметная талия за линией ребер, если смотреть сверху; небольшая жировая прослойка на животе</p>	<p>6</p> <p>Ребра прощупываются под немного избыточным слоем жира; есть брюшная жировая прослойка, но не явная; нет подтянутости живота</p>
<p>2</p> <p>Ребра и позвоночник хорошо видны (у короткошерстных кошек); очень мало мышечной массы; нет явного жира; выраженная подтянутость живота</p>		<p>7</p> <p>Ребра прощупываются под среднеизбыточным слоем жира; талию почти не видно; умеренная жировая прослойка на животе; заметное округление живота</p>
<p>3</p> <p>Ребра легко прощупываются; позвоночник виден; мало жира; выраженная подтянутость живота</p>		<p>8</p> <p>Ребра не прощупываются под избыточным слоем жира; нет талии; явно округлый живот; жировая прослойка вокруг позвоночника; заметная жировая складка на животе</p>
<p>4</p> <p>Ребра и позвоночник легко прощупываются; видна подтянутость живота; нет брюшной жировой прослойки</p>		<p>9</p> <p>Ребра не прощупываются под избыточным слоем жира; толстая жировая прослойка на спине, морде и конечностях; висящий живот и отсутствие талии; обширные жировые отложения на животе</p>

## КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЕС КОШКИ

### Изменение рациона

Помочь кошке похудеть можно, изменив тип и количество пищи, но любые перемены в рационе должны быть постепенными: сильно ограничивать потребление пищи опасно. Лучше всего кормить кошку несколько раз в день, а не давать ей постоянный доступ к пище. В зоомагазинах есть диетические продукты для похудения, а в ветеринарной клинике можно получить консультацию на эту тему. Если у вашей кошки сильное ожирение, ветеринар составит план диеты, и это поможет ей сбросить вес здоровым способом.

**Ниже:** один из лучших способов предотвратить ожирение у кошки — взвешивать пищу и внимательно отмерять порции.

Чтобы перевести кошку на новый корм, сначала предложите ей небольшое количество нового вместе с привычным. Если рацион кошки в основном состоит из сухого корма, стоит подумать о переходе на влажный.

Обсудите это с ветеринаром, чтобы понять, будет ли это полезно для кошки.

Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это лакомства. Не давайте кошке еду человека, а также замените кошачьи лакомства на низкокалорийные.

### Поддержание формы

Простой способ помочь кошке тратить больше энергии — заставить ее отрабатывать еду. На с. 29 мы уже говорили о кормушках-головоломках и интеллектуальной стимуляции; это хороший способ побудить питомца двигаться: вы кладете еду в игрушку, и кошка должна совершать действия, чтобы вытащить ее.




Если кошка постоянно живет в помещении, особенно важно помочь ей быть физически активной. Старайтесь каждый день выделять по 15–30 минут на игру. Если у кошки есть любимая игрушка, заставьте кошку прыгать и бегать за ней. Не нужно покупать дорогие игрушки, достаточно взять веревочку и привязать ее на палку, это уже вызовет интерес. Поиграйте с мячиком для пинг-понга или скомканным листом бумаги.

Если у вас нет времени играть с кошкой каждый день, подумайте о покупке электронной игрушки. Оставляйте бумажные пакеты, коробки и игрушки, когда уходите, так вы побудите кошку играть самостоятельно. Многоуровневое дерево-когтеточка тоже стимулирует физическую активность.

**Ниже:** физическая нагрузка — залог крепкого здоровья; чтобы кошка, живущая только в помещении, двигалась, больше играйте с ней.

## ВАЖНО

Если вы позволяете кошке играть с пакетами, обрежьте ручки, чтобы избежать травмы.



# ПАРАЗИТЫ

Кошачьих паразитов можно разделить на две категории: внутренние и внешние. Если их не лечить, развиваются серьезные проблемы со здоровьем, которые могут закончиться летальным исходом. Некоторые паразиты опасны и для человека, поэтому важно проводить профилактику.


## ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ

Общие внутренние паразиты кошек — это глисты и другие паразиты, живущие в желудочно-кишечном тракте. Единственный способ обнаружить у кошки глистов — посмотреть на кошачьи фекалии. Клинические признаки включают слабость, проблемы с кишечником, метеоризм, рвоту, диарею, потерю веса, вздутый живот и кровь в стуле.

Профилактику глистов нужно проводить с раннего возраста, так как кишечные паразиты часто встречаются у котят. Необходимо показать котенка ветеринару в возрасте около 8 недель, чтобы назначить схему дегельминтизации. Если вы считаете, что у вашей взрослой кошки глисты, покажите ее ветеринару для диагностики и обсуждения лечения.



КРУГЛЫЙ ГЛИСТ



НОСИТЕЛЬ

Рвота

Слабость и потеря веса

Метеоризм, диарея, кровь в стуле

Проблемы с кишечником, вздутие живота



ПЛОСКИЙ ГЛИСТ

**Слева:** обращайте внимание на любые признаки наличия внутренних паразитов. Если вы заметили какие-то из них, покажите кошку ветеринару.

## ВНЕШНИЕ ПАРАЗИТЫ

Наиболее распространенные внешние паразиты у кошек — это блохи, клещи и ушные клещи.

### Блохи

Если вы увидели на кошке блоху, весьма вероятно, она заражена паразитами, ведь молодые блохи и их яйца почти не видны невооруженным глазом. Кроме того, вы наверняка заметите, что кошка беспокойна, слишком часто вылизывается, чешется и выкусывает шерсть, а также часто мотает головой.

Блохи, как правило, передаются при контакте с другими животными — как домашними, так и грызунами. Чтобы предотвратить появление блох, следует регулярно проводить профилактику. Начинать можно в возрасте около 6–8 недель, в зависимости от препарата. Защитные средства от блох выпускаются в различных формах: таблетки, ошейники и капли. Не используйте препараты для собак, так как их ингредиенты бывают токсичны для кошек.



БЛОХА

**Сверху:** кошки, которых выпускают гулять на улицу, контактируют с большим количеством животных — другими кошками и дикими животными, переносчиками паразитов.

## КАК ИЗБАВИТЬ КОШКУ ОТ БЛОХ

Если вам кажется, что у вашей кошки блохи:

- Покажите ее ветеринару.
- Если у вас несколько домашних животных и у одного из них обнаружили блохи, лечить нужно всех питомцев в доме.
- Обработайте ковры и постельное белье. Блошинные яйца и личинки выживают в мягкой мебели до полугода, и если от них не избавиться, то они снова заразят кошку.

**Справа:** избавиться от блох очень сложно. Необходимо бороться с паразитами на всех стадиях их жизни.



## Ушные клещи

Ушные клещи встречаются и у кошек, и у котят. Они передаются от кошки к кошке, поэтому, если у одного животного нашли паразитов, лечить нужно всех кошек в доме. Если у кошки ушные клещи, она часто чешется, а в ушах появляются воспаление и загрязнения.

### МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ УШНОЙ КЛЕЩ

Если вы считаете, что у вашей кошки есть ушные клещи, следует показать ее ветеринару: почистить уши и проконсультироваться насчет лечения.

УШНОЙ КЛЕЩ



Клещи микроскопические, но кошке они доставляют много дискомфорта

Покраснение и темно-коричневые загрязнения в ушной раковине

Может образоваться черная корочка, закупоривающая слуховой проход



## ВАЖНО

Не используйте ватные палочки самостоятельно, поскольку ими можно повредить ухо кошки.


## Клещи

Клещи живут в высокой траве и цепляются за животных, когда те проходят мимо. Если кошка выходит гулять, ее может укусить клещ. Кроме того, клещи переползают с других животных или одежды. В зависимости от образа жизни кошки и места, где вы живете, рекомендуется рассмотреть вопрос о профилактике клещей в течение года или сезона. Проконсультироваться можно со своим ветеринаром.

Если кошку укусил клещ, необходимо его удалить, чтобы предотвратить заболевания. Можно обратиться к ветеринару или удалить клеща самостоятельно с помощью экстрактора (его можно купить в ветеринарной клинике и онлайн). Не следует удалять клеща острым пинцетом. При сильном сжатии насекомое выпустит все содержимое в кровь кошки, и она может заболеть. Внимательно следите за кошкой, особенно если вы не знаете, как давно произошел укус. Клещ мог успеть заразить животное, поэтому наблюдайте за признаками, такими как усталость, потеря аппетита и вялость. Если вы заметили, что кошке нехорошо, обратитесь к ветеринару.

## КАК УДАЛИТЬ КЛЕЩА С ПОМОЩЬЮ ЭКСТРАКТОРА

Инструменты бывают разных размеров — выберите подходящий для клеща, укусившего кошку. Чтобы удалить клеща, выполните следующие действия:




1

**1** Вымойте руки и осторожно раздвиньте мех вокруг места укуса, чтобы клеща было видно.

**2** Скользящим движением расположите инструмент так, чтобы клещ оказался между зубцами.

**3** Инструмент нужно располагать как можно ближе к коже.

**4** Осторожно приподнимите его и поверните несколько раз, чтобы «выкрутить» клеща (но не выдергивайте!).



4

**5** Положите клеща в банку и залейте спиртом, чтобы убить его, а затем выбросьте за пределы дома.

**6** Протрите место укуса физраствором (раствором натрия хлорида).

**Справа:** перед удалением клеща вымойте руки, приготовьте инструмент, физраствор, спирт и баночку.



# ПОЖИЛЫЕ КОШКИ

С возрастом поведение и образ жизни животного меняются. Как и люди, кошки становятся спокойнее и меньше двигаются. Пожилые кошки не так активны, как молодые, им нужно меньше пищи; меняется и характер. Не существует определенного возраста, в котором кошка становится «старой», но пожилыми кошки считаются с 11 лет. Признаки старения могут появиться уже в 7 лет, но чаще они не проявляются до 12 лет. Начиная с 15 лет возраст считается преклонным.

## КАКОВЫ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ?

Кошки стареют по-разному, это зависит от ряда факторов, включая породу. Но есть и общие признаки, которые нетрудно заметить. У пожилых кошек начинаются проблемы с органами чувств, они теряют обоняние, слух и чувство вкуса. В результате падает аппетит или меняется режим питания, однако изменение аппетита может быть признаком и других развивающихся с возрастом проблем, например болезни зубов.

Кошке становится  
сложнее  
вылизываться,  
снижается гибкость

Вероятный  
остеоартрит

**Справа:** по мере старения у кошки меняются поведение, здоровье и внешний вид.



## ПОЖИЛАЯ КОШКА

Выпадает шерсть

Аппетит снижается

Страдает  
иммунная системаКошка становится  
менее активнойКошка  
больше пьетКошка  
больше спитУхудшается  
обоняниеМеняется  
поведение

Если вам кажется, что кошке больно при выполнении повседневных действий (на с. 112 вы прочитаете, как определить, что кошка испытывает боль), покажите ее ветеринару. Слабость — один из признаков старения, но кошке не должно быть больно; есть способы лечения возрастных заболеваний.

**+** КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,  
ИСПЫТЫВАЕТ ЛИ КОШКА БОЛЬ с. 112

Пожилые кошки не так проворны, суставы теряют подвижность. Они часто болеют остеоартритом, но он поддается лечению. Из-за потери гибкости кошке становится сложнее умыться. Чтобы ее шерсть оставалась чистой и блестящей, выделяйте время для ежедневного ухода за кошкой. С возрастом в шерсти появляются белые волоски и она меньше лоснится.

Как и у людей, иммунная система пожилых кошек работает хуже, и вероятность подхватить инфекцию возрастает. Если у другой кошки в доме вы обнаружили признаки болезни, обязательно держите миски для еды и питья, а также лоток и игрушки пожилой кошки отдельно.

Поведение тоже меняется. Трудно предсказать, каким оно будет, поскольку все индивидуально. Одни кошки становятся более ласковыми, проводят больше времени с владельцем, другие — проявляют повышенную агрессию и предпочитают одиночество. Большинство пожилых кошек стараются держаться подальше от громких звуков, новых людей и предметов.



Вы также заметите, что кошка спит больше, чем раньше. Часто пожилые кошки издают звуки в нехарактерное время, в том числе ночью.

Важно регулярно показывать пожилую кошку ветеринару. Во многих клиниках есть специальные программы для пожилых животных, особенно восприимчивых к проблемам со здоровьем.

Если вы заметили, что кошка потеряла аппетит, чаще ходит в туалет или больше пьет, стала неуклюжей, начала хромать или демонстрировать тревожное поведение, например дезориентированность, необходимо обратиться к ветеринару. Часто это признаки ухудшения состояния здоровья (что поддается лечению).

**Выше:** чтобы у стареющей кошки была здоровая шерсть, можно регулярно помогать ей ухаживать за собой.

**Слева:** иногда с возрастом кошка становится более ласковой, и ей нужно больше внимания, чем раньше.



## КАК ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ ПОЖИЛОЙ КОШКЕ

Существует много способов улучшить качество жизни стареющей кошки.

### Лоток

Даже если кошка обычно ходит в туалет на улицу, рекомендуется поставить в доме лоток, когда она начнет стареть. Животное станет слабее и, возможно, не захочет выходить на улицу каждый раз, как раньше.

Если кошка ходит в лоток, ей будет удобнее, если он станет больше по площади, а бортики – ниже, чтобы легче в него забираться. Подумайте о том, чтобы поставить дополнительный лоток: так кошке не придется ходить в туалет далеко.

### Уход

Регулярно следите за чистотой кошки и проверяйте ее когти. Из-за меньшей активности они могут отрастать длинными, и в этом случае лучше всего их подрезать (можно сделать это самостоятельно, следуя советам на с. 25, или отвезти ее в ветеринарную клинику).

### Питание

По мере старения необходимо менять количество пищи, содержание питательных веществ и текстуру. Наблюдайте за кошкой, чтобы понимать, не теряет ли она в весе, что может быть признаком болезни, и не набирает ли вес, что повышает риски разных заболеваний. Если вес кошки не меняется и у нее нет никаких проблем с едой, можно сохранить привычный рацион. Если вы считаете, что нужно поменять режим питания, проконсультируйтесь с ветеринаром, проверьте ее здоровье и обсудите варианты. Есть много доступных кормов, специально разработанных для пожилых кошек. Следите за тем, чтобы у питомца всегда была вода.



**Выше:** чтобы не было проблем с когтями, например вросших когтей, регулярно проверяйте и обрезайте когти, если они отрастают слишком длинными.

### Что поменять в доме


Если вы замечаете, что кошке стало сложнее запрыгнуть на свое любимое место или трудно спуститься, поставьте для нее более низкий предмет мебели, который она будет использовать в качестве дополнительной ступени. Последите за кошкой, когда она пойдет на любимое место, и подумайте, что можно сделать, чтобы ей было удобнее. Пожилой кошке бывает легче есть и пить из миски, стоящей чуть выше пола, поэтому можно поставить емкости на невысокую платформу.

# ПОЧЕМУ КОШКА НЕ ЕСТ?

Если кошка потеряла аппетит, следует показать ее ветеринару. Потеря аппетита может быть признаком более серьезной проблемы, в том числе многих заболеваний.

Причины потери аппетита бывают разными — от стресса до проблем с зубами. Если вам кажется, что кошке больно, когда она ест, проверьте ротовую полость на наличие травм или проблем с деснами либо зубами (если она позволит вам это сделать). Если кошка не ела в течение суток, отнесите к этому серьезно и незамедлительно покажите ее ветеринару.

**Ниже:** ветеринар определит, есть ли признаки заболевания десен или зубов, которые могут приводить к потере аппетита.



## КАК УГОВОРИТЬ КОШКУ ПОЕСТЬ

Если кошка ест, но не так много, как обычно, можно попробовать дать ей другой корм. Кошки любят рыбные консервы и печень. Дайте ей небольшую порцию еды, от которой она вряд ли откажется. Помните, что кошки больше любят теплую еду. Можно слегка подогреть ее в микроволновой печи (главное, чтобы еда не была слишком горячая и кошка не обожглась). Можно также налить в обычный корм немного несоленого куриного, говяжьего или овощного бульона.


**Ниже:** у вашей кошки наверняка есть еда, перед которой ей трудно устоять, например рыбные консервы, печень или курица, особенно если они теплые.




Сардины



Вареная печень



Теплая вареная курица







**БАЗОВАЯ ПЕРВАЯ  
ПОМОЩЬ И УХОД**

# КАК ОСМОТРЕТЬ КОШКУ

## ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Когда вы впервые заметили, что с кошкой что-то не так, оцените ее состояние, следуя инструкции:

- Подойдите к кошке как можно ближе (если это безопасно), но стараясь не беспокоить ее.
- Посмотрите, есть ли у нее заметные ранки, деформации, признаки дезориентации, не хромает, не дрожит и не дергается ли она.
- Запишите все проблемы и известные вам причины их появления.
- Если вы заметили рану на голове или позвоночнике или если у кошки рвота, потеря ориентации и дрожь, обратитесь в ветеринарную клинику и рассматривайте ситуацию как экстренную.

## ПРОВЕРКА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Как только вы оценили состояние вашей кошки, следующий важный шаг — проверить ее жизненные показатели. К ним относятся частота дыхания, пульс и температура.

Снять точные показатели можно, взяв кошку на руки так, чтобы она не двигалась (см. с. 72). В идеале стоит потренироваться делать это заранее, когда кошка спокойна и здорова, чтобы быть готовым в случае необходимости.

**Ниже:** осторожно приближайтесь к травмированной кошке, без резких движений и громких звуков, чтобы не напугать ее и не вызвать агрессию.

Помните, если кошка присела скукожившись, прижала уши и рычит, она может вас укусить

Говорите с ней мягким голосом

Если у кошки травма или она больна, приближайтесь к ней медленно, без резких движений



## ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ

**Норма: 15–30 вдохов в минуту**

**Самый простой способ проверить частоту дыхания кошки — наблюдать, как она дышит, посадив ее мордой к себе:**

- 1** Смотрите на движение груди сидящей кошки.
- 2** Подсчитайте, сколько вдохов кошка делает за 15 секунд.
- 3** Умножьте это число на 4, чтобы получить показатель частоты дыхания в минуту.
- 4** Если кошка дышит гораздо чаще или реже, чем нужно в норме, незамедлительно обратитесь к ветеринару.
- 5** Если частота дыхания кошки находится в пределах нормы, посмотрите, не кажется ли вам ее дыхание необычным.

- 6** Если кошка вдыхает неровно, дышит с трудом или неглубоко, обратитесь к ветеринару.

Понаблюдайте за здоровым дыханием кошки, чтобы заметить в нем изменения в экстренном случае




**Взрослая кошка:**  
15–30 вдохов в минуту



**Новорожденный котенок:**  
20–40 вдохов в минуту




## ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОШКИ



## ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА

Норма: 120–220 ударов в минуту




- 1 Чтобы определить, где находится сердце, положите руку кошке на бок под левым локтем.
- 2 Немного надавите, чтобы почувствовать сердцебиение.
- 3 Посчитайте количество ударов в течение 15 секунд, следите по часам.

- 4 Умножьте это число на 4, чтобы получить количество ударов в минуту.
- 5 Если показатели выше или ниже нормы, обратитесь к ветеринару.



### СЕРДЦЕ КОШКИ



## ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

**Норма: 38–39 °C**

Измерять температуру кошке самостоятельно не рекомендуется. Процедура вызывает у животного стресс, и если у вас нет опыта, то можно повредить ей анус или прямую кишку. Не говоря уже о том, что кошка может сильно поцарапать вас при попытке вставить ей термометр против ее желания! Существуют ушные термометры, но они не очень точны.

## ПРОВЕРКА ДЕСЕН

Полезно проверять состояние десен у кошки. Здоровые десны розового цвета; при наличии проблемы десны сохнут или меняют цвет. Если при осторожном надавливании на десну естественный розовый оттенок восстанавливается более двух секунд, то, возможно, есть проблема. Если десны бледные, темные или любого другого цвета, кроме розового, нужно обратиться к ветеринару.

## ВАЖНО

Если какие-то показатели выходят за границы нормы, незамедлительно обратитесь к ветеринару.

## БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР

Если жизненно важные показатели кошки в норме, но вам все же кажется, что она не в порядке, можно осмотреть ее более тщательно. Если вы утвердительно ответили на какой-то из приведенных ниже вопросов, вашей кошке действительно нужна помощь.

**Ниже:** если кошка ведет себя нетипично, можно провести более тщательный осмотр, чтобы проверить, нет ли признаков травмы или болезни.

**Проверьте глаза кошки. Не расширены ли зрачки, нет ли покраснения области вокруг глаз?**

**Проверьте десны кошки. Не обесцвечены ли они?**

**Кошку тошнит или рвет? Есть ли проблемы с мочеиспусканием?**

**Осторожно ощупайте тело кошки. Нет ли негативной реакции, когда вы прикасаетесь к какой-то части тела?**

**Проверьте, нормально ли кошка ходит. Нет ли хромоты или изменения походки?**



# КОГДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ВЕТЕРИНАРУ

Если кошка пострадала и вы не можете определить, насколько серьезна травма, как узнать, когда нужно обращаться к ветеринару? Лучше перестраховаться.

Невооруженным глазом бывает сложно определить, насколько серьезно повреждение. В клинике вам могут сказать, что все в порядке, но, если врач не уверен, у него, в отличие от вас, есть знания и необходимое оборудование, чтобы обследовать кошку. Часто в клинику нужно звонить заранее, чтобы ветеринар знал, что произошло, смог дать советы и, если ситуация чрезвычайная, подготовился к вашему приезду.

**Ниже:** кошки хорошо скрывают, когда у них что-то болит. Вы лучше всех знаете вашу кошку. Если вы заподозрили признаки травмы или болезни, покажите ее ветеринару.




## КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВЕТЕРИНАРА

Если вы заметили у кошки признаки болезни, необходимо показать ее ветеринару.

Если закрыта ваша клиника, обратитесь в скорую ветеринарную помощь.

Если вы обнаружили хотя бы одну из перечисленных ниже проблем, незамедлительно обратитесь в ветеринарную клинику:

- травма (даже если самочувствие кошки кажется хорошим);
- затрудненное дыхание;
- ожог;
- возможное отравление;
- удар по голове;
- падение с высоты;
- проглатывание инородного предмета;
- судороги;
- удар электрическим током;
- падение в воду с риском захлебнуться.



**Выше:** бывают случаи, когда необходимо обратиться в клинику, поскольку самостоятельно решить вопрос не получится. Можно предпринять определенные шаги, чтобы стабилизировать состояние животного, но профессиональная помощь должна быть в приоритете.

Незамедлительно обратитесь в ветеринарную клинику, если обнаружили у кошки какой-либо из следующих признаков:

- сильная лихорадка;
- высокий пульс;
- высокая частота дыхания;
- продолжающаяся рвота и/или диарея;
- хромота;
- бессознательное состояние;
- дезориентация;
- бледные десны;
- множественные или длительные судороги;
- обморок;
- сильная боль;
- обильное кровотечение;
- паралич;
- затрудненное мочеиспускание;
- отсутствие аппетита или желания пить;
- продолжительный кашель.

Если признаки сохраняются более 48 часов или вы не знаете, когда это началось, лучше показать кошку ветеринару и проверить ее здоровье.



**Выше:** если кошка упала в воду и пробыла там какое-то время, покажите ее ветеринару; возможны последствия, которые вы не сможете распознать самостоятельно.

## СИТУАЦИИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ЭКСТРЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ К ВЕТЕРИНАРУ

Если у кошки небольшая травма и вам удалось перевязать ее по инструкциям, описанным в книге, все равно лучше показать кошку специалисту.

**Справа:** если у кошки небольшая рана, можно оказать первую помощь дома, используя методы, описанные в этой книге, и уже потом отвезти ее к ветеринару.

ОБРАБОТКА НЕБОЛЬШОЙ РАНЫ



При наложении повязки не забудьте оставить небольшое пространство, чтобы она не давила

Если кошка ведет себя необычно, например слишком ласкается к вам, возможно, есть какая-то проблема

Ниже: внимательно наблюдайте за кошкой, обращая внимание на изменения в поведении; это может быть признаком боли.

Следует также показать кошку ветеринару, если вы заметили изменения в обычном образе жизни или движениях кошки

НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ



## СИТУАЦИИ, С КОТОРЫМИ МОЖНО СПРАВИТЬСЯ ДОМА

Бывают не очень серьезные повреждения, с которыми можно справиться в домашних условиях, например небольшой порез или укус пчелы. Но и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со своим ветеринаром.

В качестве альтернативы можно воспользоваться специальным приложением для смартфона/планшета и задать вопрос ветеринарному хирургу или получить видеоконсультацию. Ветеринары, предлагающие эту услугу, обычно не диагностируют кошку по телефону, но посоветуют, нужно ли обращаться в клинику скорой помощи.

**Ниже:** интернет — это минное поле, полное неверной информации в отношении ухода за животными. Лучше искать приложения и сайты, напрямую связывающие вас со специалистом.

### ВАЖНО

В поисках информации о том, как оказать помощь кошке, не стоит полагаться на интернет. В Сети много неверных и противоречивых данных. Достоверную информацию следует искать на сайтах ветеринарных клиник и организаций, занимающихся защитой животных. В экстренной ситуации всегда обращайтесь к ветеринару.



# АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Если у кошки наблюдаются признаки нездорового состояния, описанные на с. 63, лучше всего обратиться к профессионалу. Однако в качестве подручного средства не помешает держать дома кошачью аптечку первой помощи.

## ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КОШАЧЬЕЙ АПТЕЧКЕ?

Безусловно, нельзя предсказать, когда произойдет несчастный случай, но, если у вас под рукой есть все необходимое, вы сможете быстро и правильно оказать первую помощь и только потом отвезти животное в ветеринарную клинику.

Готовые аптечки для кошек можно приобрести в интернете или зоомагазинах. Независимо от того, купили вы готовую аптечку или сами

собрали ее, проверьте по списку, есть ли там все необходимое, а также изучите, как использовать те или иные предметы для оказания первой помощи.

Большинство предметов из списка можно приобрести в любой аптеке. Поскольку многие из них продаются в больших упаковках, возможно, что-то удастся подобрать из вашей личной аптечки.

**Ниже:** заранее изучите, что должно быть в аптечке первой помощи для кошек; проверьте по списку, чтобы у вас было все необходимое. Убедитесь, что все работает и не имеет дефектов. Если вы взяли что-то из личной аптечки, не забудьте потом это докупить.



## САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

### Одноразовые резиновые или латексные перчатки

Соблюдайте чистоту и меры безопасности, чтобы не подхватить инфекцию при обработке кошачьей раны. Если кошка царапается и вырывается, для защиты можно также купить садовые перчатки.



Ниже и справа: большинство предметов для аптечки первой помощи можно приобрести в аптеке, но некоторые, например клещедер, лучше искать в ветеринарной клинике.

### Ножницы

Необходимы для разрезания пластыря или бинтов. Ими лучше не стричь шерсть, чтобы случайно не повредить кожу. Для того чтобы выстричь колтуны или шерсть вокруг раны, подойдет небольшая машинка для стрижки на батарейках, но следует соблюдать крайнюю осторожность.

### Пинцет

Нужен для удаления заноз и прочих инородных тел. Важно иметь два: с плоскими концами, чтобы случайно не травмировать кошку, и с изогнутыми — для удаления предметов из горла.



### Экстрактор клещей

Клещедер понадобится для удаления клещей (см. с. 49). Он намного безопаснее пинцета и проще в обращении.



### Полотенца

Необходимы, чтобы положить на них кошку во время обработки или транспортировки.



## ОБРАБОТКА РАН

### Соль

Необходима для приготовления физраствора — это лучший вариант для обработки раны в домашних условиях перед перевязкой. (Физраствор также можно недорого приобрести в аптеке. *Прим. ред.*)

### Ватные палочки и тампоны

Ими удобно наносить на рану физраствор и очищать ее от крови.

### Пипетка или пластиковый шприц без иглы

Пригодится для промывания ран физраствором; также с их помощью можно давать кошке лекарство или воду.

### Антисептические салфетки

Протрите ими руки, прежде чем прикасаться к ране. При обработке раны надевайте перчатки, чтобы защититься от возможной инфекции.

**Слева и ниже:** в аптечке должно быть все необходимое для обработки ран; даже если соль есть у вас на кухне, держите небольшой запас в аптечке, чтобы она была под рукой.



## ПЕРЕВЯЗКА РАН

### Марля

Марлю можно использовать как впитывающую салфетку или в качестве материала для обертывания, чтобы создать небольшое давление на рану. При наложении повязки на лапы соблюдайте осторожность: слишком тугая повязка нарушит кровообращение или приведет к образованию рубцов.

### Неприлипающие бинты

Хорошо работают для защиты ран и уменьшения кровотечения. Не используйте для кошек самоклеящиеся бинты или пластыри. Для фиксации повязки подойдет детский носочек: кусочком бинта подвяжите носок — такая повязка будет меньше сдавливать лапу.

### Клейкая лента


Пригодится, чтобы крепить бинты и марлевые повязки.

## ЕСЛИ КОШКА КУСАЕТСЯ

### Намордник

В качестве намордника можно использовать мягкую ткань, небольшое полотенце или нейлоновый чулок; прибегайте к ним только в крайнем случае, так как это большой стресс для животного. Не надевайте кошке намордник, если ее рвет.

**Ниже:** держите в кошачьей аптечке только обычные бинты и марлевые салфетки; самоклеящиеся бинты и пластыри не подходят для кошек.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

### Физраствор /

раствор для промывания глаз


Наносить на глаза в случае травмы.

### Список важных телефонных номеров

Сюда относятся телефоны вашей ветеринарной клиники и ближайших круглосуточных ветеринарных клиник.

### Медицинская карта вашей кошки

Должна включать список всех лекарств, которые принимает кошка, и полную историю вакцинации. Ветеринару необходимы эти сведения, если вы обращаетесь со срочным случаем не в свою клинику.



# КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ТРАВМИРОВАННОЙ КОШКОЙ

Если кошка пострадала или у нее что-то болит, она может вести себя непривычно: прятаться, не хотеть на руки или проявлять повышенную агрессию. Даже самые ласковые кошки становятся агрессивными, если им больно.

## КАК ПОДОЙТИ К КОШКЕ

Прежде чем подойти к кошке, необходимо перекрыть ей пути для побега: затворить окна и двери.

Как и в случае с людьми, прежде чем перемещать кошку, нужно проверить, есть ли у нее травмы. Будьте особенно осторожны, если у кошки травма головы, нарушена координация или животное дезориентировано. Если кошка не может встать, обратитесь за советом к ветеринару. Возможно, он приедет к вам на помощь. При обращении с пострадавшей кошкой соблюдайте осторожность, чтобы не причинить вред и не усугубить травму, а также не подвергнуть риску себя. Если кошка пострадала, действуйте по инструкции:

- Осмотрите кошку, перемещая ее аккуратно и плавно.
- Держите лицо подальше от рта кошки на случай, если она попытается укусить вас.
- Сохраняйте спокойствие, если вы заметили у животного травму. Пока вы спокойны, кошка тоже будет менее агрессивна и более сдержана.
- Перед тем как перенести кошку, осмотрите ее, следуя инструкции на с. 58.

## ВАЖНО

Помните, что кошки хорошо умеют скрывать боль.

- Если у кошки травма головы или позвоночника, постарайтесь не шевелить ее и немедленно позвоните ветеринару. Врач расскажет, как обездвижить голову, прежде чем переносить животное.

Обратитесь к ветеринару, даже если вам кажется, что травма незначительная. Любые травмы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Расскажите врачу, что произошло, спросите его совета и сообщите, что едете в клинику. В некоторых случаях вы можете оказать первую помощь дома и только потом отвезти кошку в клинику. Если вы подозреваете перелом или растяжение связок, заверните кошку так, чтобы ограничить движение этой части тела, и только потом перемещайте кошку.

## СОВЕТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОШКОЙ

Чтобы не беспокоить кошку, приближаясь к ней, ведите себя следующим образом:


**1** Медленно и спокойно приближайтесь к кошке, разговаривая с ней мягким голосом.

**2** Подойдите к кошке и наклонитесь так, чтобы быть с ней на одном уровне, не нависая над ней.

**3** Продолжайте говорить с кошкой, отмечая любые изменения в ее поведении. Понаблюдайте за движениями кошки, проверьте, не расширены ли зрачки, обратите внимание на звуки, которые она издает.

**4** Если кошка испугана или агрессивна (рычит или шипит, широко раскрыв глаза с расширенными зрачками и прижимая уши), не пытайтесь ее погладить.

**Ниж:** даже если ваша кошка обычно ласкова и неагрессивна, ее поведение может измениться при травмах и боли, поэтому приближайтесь к ней осторожно и тихо.




УСПОКОЙТЕ КОШКУ

**5** Если кошка не агрессивна (сидит сжавшись, мурлычет или дрожит), успокойте ее, погладив по голове. Если ей нравится, продолжайте гладить как обычно, чтобы успокоить ее.




## КАК ДЕРЖАТЬ СПОКОЙНУЮ КОШКУ


Способ удерживания зависит от поведения животного, а также от того, есть ли у вас помощник. Если кошка вырывается, следуйте инструкциям на противоположной странице. Если она не проявляет признаков агрессии, можно держать ее следующим образом:



**1** Обхватите кошку рукой под грудью и держите ее у своей груди, чтобы она была между вами и вашей рукой.




**2** Затем перенесите руку, которая ближе к передней части, под живот, чтобы поддерживать лапы и туловище.



**3** Другой рукой держите голову кошки, чтобы она не двигалась.


### ВАЖНО

Помните, что нельзя надевать кошке намордник, если ее рвет; это может привести к удушью и даже смерти.




## КАК ДЕРЖАТЬ МЕНЕЕ ПОКЛАДИСТУЮ КОШКУ

Если кошка вырывается и проявляет признаки агрессии, действуйте следующим образом:



**1** Заверните кошку в полотенце или покрывало.

**2** Сделайте так, чтобы все лапы находились внутри.



**3** Поднимите завернутую кошку.

**4** Чтобы осмотреть кошку, оголите только поврежденную область.

### НА САМЫЙ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ

К этим действиям стоит прибегать, только если кошка агрессивна, поскольку животное испытывает большой стресс. Держа кошку за шкуру, никогда не оставляйте ее без поддержки снизу, так как это болезненно и может привести к повреждению мышц.

- Поднимите кошку за складку на шее, расположенную чуть ниже ушей.
- Другой рукой поддерживайте кошку за задние лапы.
- Положите кошку на стол или плоскую поверхность раной вверх.
- Продолжайте удерживать кошку, слегка растягивая ее вперед за шкуру и назад за лапы.
- Если кошка не хочет сидеть на месте, положите ее в большую открытую коробку.



**5** Если у кошки травма головы или позвоночника, необходимо обездвижить ее голову.

## ТРАНСПОРТИРОВКА КОШКИ

После того как вы осмотрели кошку и оказали ей первую помощь, посадите животное в переноску. Туда же положите покрывало или полотенце: запах дома успокоит ее; кроме того, ткань не позволит ей двигаться слишком активно и сделает поездку более комфортной. Если частично накрыть переноску, кошка будет чувствовать себя свободнее.

Если вы едете в ветеринарную клинику на машине, поставьте переноску на заднее сиденье и закрепите ее ремнем безопасности. Не допускайте, чтобы кошка ходила по салону, пока вы за рулем.

Если на улице жарко, возьмите завернутый в полотенце пакет со льдом на случай, если кошка перегреется. Если на улице холодно или вы заметили, что кошка дрожит, накройте переноску одеялом или заверните кошку в полотенце, чтобы она не замерзла. Как и у людей, у кошек случается посттравматический шок (с. 116). Возьмите с собой аптечку и все важные документы.



**Выше:** во время поездки в ветеринарную клинику кошке будет спокойнее, если она будет лежать на своей подстилке. Не забудьте постирать подстилку, перед тем как положить ее обратно в кошачий домик, чтобы избавиться от запаха клиники.

**+** ПОМОЩЬ ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ с. 117

## КАК СДЕЛАТЬ НОСИЛКИ

Если кошка не реагирует на вас и вы подозреваете травму позвоночника, сделайте носилки из плотного одеяла, полотенца, доски или твердого картона.

Если вам нужно зафиксировать кошку с помощью подручных средств, привяжите ее туловище (но не голову или шею) веревкой к доске или обмотайте тканью туловище кошки вместе с доской.



## КАК ВЫБРАТЬ ПЕРЕНОСКУ


Нет ничего плохого в том, чтобы взять подержанную переноску, но убедитесь, что все крепления и замки в хорошем состоянии.

- Самый безопасный и удобный вариант — пластиковые или стеклопластиковые переноски.
- Хорошо, если у переноски две дверцы, сверху и сбоку, в такой кошкам спокойнее; можно поместить кошку через верхнюю дверцу, а выйдет она в боковую.
- Допустимо использовать клетку, обернутую покрывалом, но это не так удобно для кошки, как пластиковая переноска. У клетки иногда нет герметичного дна.
- Мягкие переноски можно использовать при условии, что они прочные, вентилируемые и подходят кошке по размеру. Однако они не обеспечивают никакой защиты от ударов и могут быть негерметичными.

## КАК СДЕЛАТЬ ПОЕЗДКУ НА МАШИНЕ КОМФОРТНЕЕ ДЛЯ КОШКИ

- Распылите внутри переноски ароматизатор с феромонами, предназначенный для успокоения кошек.
- Положите в переноску лакомства или кошачью мяту.
- Не сажайте в переноску более одной кошки.
- Частично накройте переноску одеялом.
- Сведите к минимуму шуму в машине; спокойно говорите с кошкой на протяжении всей поездки.
- Закройте окна автомобиля.
- Установите в салоне комфортную для кошки температуру.
- Ведите машину осторожно, избегая резких остановок или крутых поворотов.

Мягкие переноски легче носить и проще хранить, но в них кошка меньше защищена




# ОБРАБОТКА И ПЕРЕВЯЗКА НЕГЛУБОКИХ РАН

Прежде всего наденьте латексные или резиновые перчатки, чтобы не занести себе инфекцию.

## КАК ПРОМЫТЬ НЕГЛУБОКУЮ РАНУ

- 1** Сначала остановите кровотечение (см. с. 137).
- 2** Возьмите кошку на руки и осмотрите рану.
- 3** Если в ране что-то застряло, не трогайте это и отнесите кошку к ветеринару.
- 4** Если рана глубокая, не промывайте ее; накройте чистой повязкой или тканью и отнесите кошку к ветеринару.
- 5** Если в ране нет предметов и она неглубокая, нанесите смазку на водной основе и осторожно, используя ручную машинку или тупые ножницы, обрежьте шерсть вокруг раны.



## ВАЖНО

Если кошка сильно вырывается или нервничает, прекратите процедуру, так как есть вероятность, что вы травмируете кошку или она поцарапает вас.

- 6** Промойте рану физраствором (с. 80), полив им рану и область вокруг.
- 7** Не трогайте рану руками и не удаляйте ничего из нее пальцами.
- 8** Можно аккуратно подсушить область вокруг раны, но не саму рану. (Не стоит касаться раны полотенцем или бумагой, это может нанести большой вред и помешать заживлению, повредив эпителиальные клетки, которые участвуют в его процессе.)

Нанесите на рану смазку на водной основе, чтобы шерсть не попала в рану во время стрижки


## КАК ПЕРЕВЯЗАТЬ НЕГЛУБОКУЮ РАНУ




**1** Наложите на рану стерильную марлевую салфетку и закрепите ее неприлипающим бинтом.



**2** Добавьте еще два слоя марли, чтобы она перекрывала рану на несколько сантиметров, если возможно.



**3** Наложите повязку или бинт, чтобы закрепить слои марли. Лучше всего для этой цели подойдет детский носок. Закрепите повязку надежно, но не слишком туго.



**МЯГКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВОРОТНИК**

**ВАЖНО**

Если вы обнаружили, что рана распухла, покраснела, мокнет или источает неприятный запах, обратитесь к ветеринару.

**4** Следите, чтобы повязка была чистой и сухой; при необходимости используйте ветеринарный воротник, чтобы кошка не вылизывала рану (с. 172).

**5** Меняйте повязку раз в сутки.

# ПРОБЛЕМЫ С ШЕРСТЬЮ

Причинами проблем с шерстью могут быть паразиты, аллергия или нарушение питания. Покажите кошку ветеринару, если она сильно линяет, слишком тщательно вылизывается, чешется и выкусывает себе шерсть или у нее появились припухлости под кожей и залысины.



**Слева:** грибковые инфекции кожи проявляются по-разному, и некоторые кошки генетически к ним предрасположены; часто грибок бывает следствием заболевания или аллергии.



**Выше:** если у кошки аллергия на блох, она будет сильно чесаться, а вы заметите повреждения или выпадение шерсти, обычно в задней части, вокруг головы и шеи кошки.



## КАК ПОЧИСТИТЬ ШЕРСТЬ КОШКИ, ЕСЛИ НА НЕЕ ПОПАЛИ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Если на шерсть попали вредные вещества, например краска, действуйте по следующей схеме:

- 1 Не позволяйте кошке вылизываться, надев на нее ветеринарный воротник (с. 172).
- 2 Постарайтесь смыть как можно больше вещества теплой проточной водой.
- 3 Не используйте для удаления другие химические вещества (например, растворители).
- 4 Если область поражения небольшая, можно срезать шерсть в этом месте.
- 5 Отнесите кошку в ветеринарную клинику, где ей смогут почистить шерсть, дав при необходимости успокоительное.



ИСПАЧКАННЫЕ ЛАПЫ И ШЕРСТЬ

**Справа:** пустулезные поражения кожи представляют собой небольшие гнойнички. Они образуются при нарушении кожного покрова из-за укусов или царапин, когда внутрь проникает инфекция. При аллергических реакциях появляются мелкие зудящие пустулы.



**Ниже:** аллергический дерматит возникает при аллергии на пищу или блох. Он вызывает зуд, покраснение кожи и выпадение шерсти. Реже встречается атопический дерматит — реакция на пылевых клещей, а также пыльцу деревьев и трав.



# ПРОБЛЕМЫ С ГЛАЗАМИ

Глаз — очень чувствительный орган, и травмы в области глаза могут привести к серьезным проблемам, если их не лечить должным образом.

**Ниже:** если кошке в глаз попало что-то небольшое и неострое, можно аккуратно убрать загрязнение чистой салфеткой и промыть глаз физраствором.


Промывайте пораженный глаз физраствором, каждый раз используя чистую салфетку, чтобы предотвратить инфицирование

## КАК СДЕЛАТЬ ФИЗРАСТВОР

Физраствор используют для промывания ран, носовых пазух и глаз. Чтобы приготовить его в домашних условиях, необходимо:

- Вскипятить 600 мл воды и остудить, пока она не станет теплой.
- Растворить в воде одну чайную ложку соли.

КОШАЧИЙ ГЛАЗ



**Выше:** у кошек есть верхние и нижние веки, а также третье веко, называемое мигательной перепонкой: это дополнительный защитный слой, сохраняющий глаз влажным и чистым.

## ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

- Если вы заметили выделения из глаза (они могут быть непрозрачные, покрытые корочкой или водянистые), аккуратно вытрите глаз чистой салфеткой, смоченной в теплой воде.
- Если глаз заметно выпучен, промокните его физраствором и положите на него влажную ткань.
- Если глаз кровоточит, приложите к нему марлевую салфетку. Если есть возможность, сделайте повязку. Не снимайте в течение 10 минут. Если марля пропиталась кровью, положите сверху еще одну салфетку. Не удаляйте первый слой, поскольку это может помешать свертыванию крови.

- Если прокола нет, но в глазу посторонний предмет, попробуйте смыть его прохладной кипяченой водой. Промойте пораженный глаз физраствором, каждый раз используя чистую салфетку, чтобы не занести инфекцию.

В любой из этих ситуаций необходимо как можно скорее отвезти кошку в ветеринарную клинику. То же самое нужно сделать, если вы заметили, что глаз у кошки опух, помутнел или на нем есть порезы либо слезы; если кошка не может полностью открыть или закрыть глаза; если третье веко (розовая мембрана, проходящая через глаз с ближайшей к носу стороны) закрыто.

**Ниже:** глаз — очень нежный орган; если глаз кошки поврежден, опух, мутный или болезненный на вид, покажите животное ветеринару.



# ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОШКА ГДЕ-ТО ЗАСТРЯЛА

Довольно часто кошки застревают на деревьях, это классическая ситуация. Когти кошек устроены таким образом, что им очень удобно забираться на деревья, но неудобно спускаться.

Кроме того, кошки известны способностью находить щели и пробираться в узкие проходы. Если кошка где-то застряла, но при этом ее здоровью ничего не угрожает, не паникуйте. На следующей странице вы найдете несколько советов о том, как ее можно достать.

**Ниже:** важно держать кошку на руках крепко, чтобы она не вывалась. Не рискуйте, пытайтесь дотянуться до кошки, если она внезапно выпрыгнула у вас из рук.

Если у вас не осталось идей, что делать, позовите кого-нибудь на помощь. Пожарные обычно не выезжают в таких случаях, но в зависимости от того, где застряла кошка, можно обратиться к леснику, строителям или сантехнику. Если человек согласился вам помочь, дайте ему садовые перчатки, чтобы кошка не поцарапала его, а также предложите взять с собой переноску с лакомствами, чтобы приманить кошку.



## СПОСОБЫ СПАСЕНИЯ ЗАСТРЯВШЕЙ КОШКИ

Чтобы снять кошку с дерева или откуда-то еще, выполните следующие действия:

**1** Создайте спокойную обстановку, чтобы не было большого количества раздражителей. Попросите уйти подальше детей, проследите, чтобы не было собак.

**2** Попробуйте позвать кошку.

**3** Принесите и покажите ей любимую игрушку.

**4** Принесите любимую еду своей кошки, оставьте ее на видном месте и уйдите. Когда кошке не на чем будет сосредоточиться, кроме угощения, она спустится по собственному желанию.

**5** Возьмите лазерную указку и подскажите кошке логичный спуск.



**Выше:** если кошка застряла, она, скорее всего, нервничает. Поговорите с ней ровным, мягким голосом, чтобы она успокоилась.

Если ни один из этих методов не сработает, на следующий день вам, возможно, придется воспользоваться более активными приемами спасения. Если кошка находится высоко, куда вам трудно добраться, попробуйте придумать что-то наподобие лестницы, по которой она сможет спуститься. Если у вас нет лестницы, возьмите ветку или другой предмет, который сделает спуск более плавным.



**Выше и справа:** лучший способ спасти застрявшую кошку — сманить ее вниз любимыми вещами; принесите игрушки своей кошки — увидев их, она захочет вернуться в безопасное место.



# ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД

После операции ветеринар расскажет вам, как ухаживать за кошкой и какие лекарства ей давать. Важно внимательно следовать его инструкциям. Когда пойдете в клинику забирать кошку, возьмите с собой ручку и бумагу, запишите все, что советует врач. Можно спросить разрешения записать ваш разговор на смартфон. Если вы чего-то не помните, позвоните в ветеринарную клинику и уточните.

## КАК ОБЕСПЕЧИТЬ КОШКЕ КОМФОРТ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Скорее всего, после операции кошка какое-то время будет менее самостоятельной, поэтому сделайте все возможное, чтобы ей было комфортно, когда она вернется домой. Можно

поставить спальное место кошки в тихое место, подальше от других животных и людей.

Первое время после анестезии кошка будет сонной, так что дайте ей отдохнуть и постарайтесь не беспокоить ее слишком много. Если через 12 часов кошка не вернулась в свое обычное состояние, можно позвонить в ветеринарную клинику для консультации.

## КАК КОРМИТЬ КОШКУ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Кошка может отказываться от пищи в течение нескольких часов после операции. Поставьте ей немного любимой еды на случай, если она проголодается, и не забудьте про миску с чистой водой. Если кошка поела и ее не вырвало, предложите ей еще одну порцию через час. После операции кошка может начать кашлять, если у нее в трахее была трубка для наркоза. Такая реакция может продлиться несколько дней.

**Слева:** кошке вряд ли понравится носить ветеринарный воротник, но помните, что это для ее же блага: если она залижет рану, это может вызвать инфекцию.





## ПРОГУЛКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Не выпускайте кошку на улицу до тех пор, пока она полностью не восстановится, и проследите, чтобы она не перенапрягалась. Соблюдайте рекомендации ветеринара и выпускайте ее, только если разрешил врач. Необходимо ограничить активность кошки хотя бы на одну неделю после операции, а возможно, и дольше, в зависимости от типа лечения.

## КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ХИРУРГИЧЕСКИМИ ШВАМИ

Если кошке наложили швы, возможно, придется ехать в клинику через 10–14 дней, чтобы их снять. Если при операции врач использовал рассасывающиеся нитки, вынимать их не нужно.

**Выше:** после операции кошка будет сонной; постарайтесь как можно меньше беспокоить ее и позвольте ей спать там, где она чувствует себя комфортно и безопасно. У кошки на фото шов обработан фиолетовым антибактериальным средством.

Каждый день проверяйте область шва: если заметите, что что-то не так, например появились кровотечения, выделения, покраснение или отек, звоните в клинику. Если вам кажется, что кошке больно или со временем становится хуже, а не лучше, обратитесь к ветеринару.

Если кошка дотягивается до шва и может его вылизывать, необходимо надеть ветеринарный воротник, пока она не поправится. Воротник нельзя снимать ни днем ни ночью.

# УХОД ЗА РАНАМИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ


Независимо от того, обрабатываете вы шов самостоятельно или обратились в ветеринарную клинику, важно знать, как не допустить инфицирования раны и дать ей возможность быстрее зажить.

Необходимо, чтобы рана и повязки были чистыми и сухими. Кошки, естественно,лизывают раны и могут расчесать их. Если вы заметили, что кошка лижет или чешет рану либо повязку или выкусывает швы, наденьте на нее ветеринарный воротник. Его можно приобрести в клинике или сделать самостоятельно (с. 172).

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  
ВОРОТНИК



**Выше и слева:** после операции следите за кошкой и сделайте все, чтобы рана заживала быстрее; иногда нужно надеть на кошку ветеринарный воротник.





**Слева и ниже:** если вы не знаете, как менять кошке повязки, попросите врача научить вас.



Повязку следует менять ежедневно (или чаще, если рекомендовал врач). Если для вас это сложно, а кошка вырывается, обратитесь в ветеринарную клинику. Вам также необходимо обратиться к врачу, если вы заметили отеки, неприятный запах, выделения или покраснение. Рану следует промывать (см. с. 76) не реже одного раза в день, пока она не начнет заживать.

Обязательно выполняйте предписания ветеринарного врача относительно всех назначенных лекарств!

**+** ОБРАБОТКА И ПЕРЕВЯЗКА НЕГЛУБОКИХ РАН с. 76




# КАК ДАТЬ КОШКЕ ЛЕКАРСТВО

Когда ветеринар назначает лекарство, он обычно объясняет, как давать его кошке (например, является ли оно пероральным или мазью для глаз местного применения), как часто его следует давать (например, сколько раз в день) и как долго будет продолжаться лечение.

Даже если вам кажется, что кошка идет на поправку, продолжайте курс лечения в соответствии с назначением ветеринара. Если вы что-то забыли, не стесняйтесь позвонить в клинику и уточнить.

**Выше и ниже:** если лекарство нужно давать кошке дома, ветеринар объяснит, как это делать. Если вы не уверены, что поняли, попросите его показать.






Даже если инструкции не кажутся особенно строгими, запишите их и сохраните. Можно написать или распечатать план лечения на отдельном листке и прикрепить его на кухне, отмечая каждый раз, когда вы дали лекарство. Так вы не пропустите прием.

**Выше:** если вы не уверены, что у вас получится правильно дать кошке лекарство, спросите, можно ли принести животное ветеринару, чтобы он сам дал ему таблетки.

**Ниже:** не пытайтесь на слух запомнить все, что вам скажет ветеринар; запишите рекомендации и храните в надежном месте — так вы не ошибетесь.

## ВАЖНО

Прочитайте инструкции и храните лекарства в соответствии с указаниями. Обратитесь к ветеринару, если у кошки проявляются побочные эффекты.



## КАК ОТКРЫТЬ КОШКЕ РОТ

Вот что нужно сделать, чтобы открыть кошке рот и дать лекарство:



**1** Посадите кошку на полотенце или, если она будет царапаться, заверните ее в полотенце, как в кокон, чтобы была видна только голова.

**2** Открывая кошке рот, придерживайте ее голову левой рукой (если вы правша).

**3** Положите указательный палец на одну сторону морды, а большой — на другую, обхватив при этом лоб.




**4** Слегка переместите указательный и большой пальцы так, чтобы они находились в углу челюсти. В таком положении, если голова поднята вверх, челюсть должна немного приоткрыться.

**5** Слегка приоткройте челюсть, положив кончик указательного пальца другой руки на верхнюю десну между клыками.



**6** Теперь той же рукой еще чуть-чуть приоткройте рот, нажав указательным пальцем между клыками нижней челюсти.



## КАК ДАТЬ ТАБЛЕТКУ

Сначала откройте кошке рот, следуя рекомендациям, а затем:

**1** Положите таблетку в середину задней части языка кошки. Если это сложно, вероятно, стоит купить специальное устройство («таблетко-даватель»), которое избавит вас от необходимости совать пальцы в рот кошке.

**2** Перед тем как отпустить кошку, убедитесь, что она точно проглотила таблетку.

**3** Если вы не уверены, что кошка проглотила таблетку, подержите ее некоторое время, пока не увидите, как она сделала глоток.


**4** Погладьте шею сверху вниз; можно подуть на нос кошке, чтобы стимулировать глотание.

**5** Отпустите кошку, когда будете уверены, что она проглотила таблетку.



### Выше и справа:

существует специальное устройство, с помощью которого вы легко дадите кошке пероральные препараты и вам не придется совать пальцы ей в рот.




## КАК ДАТЬ ЖИДКОЕ ЛЕКАРСТВО

Сначала откройте кошке рот, следуя рекомендациям, а затем:



- 1** Держите голову кошки прямо (не откидывая назад).
- 2** Рот должен быть открыт так, чтобы внутрь помещался шприц.
- 3** Направьте шприц между зубами и щекой с одной стороны рта.
- 4** Выпускайте лекарство медленно, время от времени делая паузу, чтобы кошка успевала глотать по мере необходимости.



Давайте точное количество лекарства, прописанное ветеринаром

**Выше и справа:** внимательно прочитайте инструкцию и наберите необходимое количество лекарства в шприц, прежде чем подходить к кошке.



## КАК ДАТЬ ЛЕКАРСТВО С ПИЩЕЙ

Самый простой способ дать кошке лекарство — спрятать его в еду. Но не все лекарства можно давать с пищей, поэтому отдельно проконсультируйтесь по этому вопросу с ветеринаром.


Чтобы у вас лучше получилось дать кошке лекарство с пищей, необходимо выполнить следующие действия:

**1** Не кормите кошку несколько часов до того, как дать ей еду с таблеткой.

**2** Дайте кошке небольшую порцию обычного влажного корма, где спрятана таблетка, и только потом добавьте оставшуюся часть порции.

**3** Если кошка сообразительна и не ест еду с таблеткой, попробуйте спрятать лекарство в любимом корме или использовать специально предназначенные для этого лакомства — «кармашки для таблеток».

**Справа и ниже:** если кошка не хочет есть таблетку с обычной пищей, попробуйте спрятать ее в консервированном тунце или других рыбных консервах либо в «кармашке для таблеток».




Чем меньше порция, а кошка голоднее, тем больше шансов, что она съест таблетку



### ВАЖНО


Не измельчайте таблетки и не добавляйте их в еду, если это не рекомендовано ветеринаром.



## КАК ЗАКАПАТЬ УШНЫЕ КАПЛИ

Одни кошки нормально переносят эту процедуру, другие же не проявляют должной любезности. Вот несколько рекомендаций для тех случаев, когда вам потребуется закапать ушные капли:

- 1 Прочитайте инструкцию и, прежде чем начать, поймите, какое количество лекарства необходимо использовать.
- 2 Держите кошку либо на коленях, сидя удобно, либо стоя, положив ее на стол.
- 3 Если вы считаете, что она может вас поцарапать, заверните ее в одеяло так, чтобы была видна только голова.
- 4 Независимо от того, в одеяле кошка или нет, держите ее в удобном положении левой рукой (если вы правша).



5

5 Этой же рукой возьмите голову кошки так, чтобы ухо, которое вы лечите, смотрело вверх.




6

6 Заверните ухо так, чтобы было видно ушной канал.

7 Если ухо нужно почистить, перед тем как капать лекарство, сделайте это (см. с. 95).

8 После того как ухо почищено, можно при- менять капли.



9

9 Ведущей рукой расположите пипетку так, чтобы она не касалась кончиком уха.

**10** Постепенно вводите нужное количество лекарства по капле.

**11** Держите ухо и, если кошка позволяет, мягко массируйте его основание примерно полминуты, чтобы лекарство проникло в глубь ушного канала.

**12** Отпустите ухо и дайте кошке потрясти головой.

**13** С помощью чистого ватного тампона уберите мусор с внутренней стороны уха.



**Выше:** когда кошка трясет головой после закапывания лекарства или чистки уха лосьоном, будьте готовы к тому, что она может вытряхнуть наружу жидкость и загрязнения.

## КАК ПОЧИСТИТЬ УШИ

Чтобы почистить кошке уши, сделайте следующее:

**1** Для чистки используйте ватные тампоны (ватными палочками можно повредить ухо кошки).

**2** Наливая лосьон для чистки ушей в ушной канал, не вставляйте кончик аппликатора в ухо.

**3** Заполните ушной канал лосьоном.

**4** Держите ухо и, если кошка не против, аккуратно массируйте его основание примерно полминуты, чтобы лосьон проник глубже в ушной канал.

**5** Чистым ватным тампоном уберите загрязнения с внутренней стороны уха.

**6** Дайте кошке потрясти головой.


**7** Затем снова протрите ухо другим чистым ватным тампоном, чтобы не осталось ни загрязнений, ни лишнего лосьона.



## КАК ЗАКАПАТЬ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ

Лучше всего действовать следующим образом:

- 1 Вымойте руки.
- 2 Держите кошку либо на коленях, сидя удобно, либо стоя, положив ее на стол.



**3** Если вы считаете, что она может вас поцарапать, заверните ее в одеяло, чтобы была видна только голова.

**4** Независимо от того, в одеяле кошка или нет, держите ее в удобном положении левой рукой (если вы правша).

**Выше справа:** перед тем как закапать капли, проверьте кошке глаза; если есть какие-то выделения или глаз мокрый, очистите его перед введением лекарства.



**5** Той же рукой зафиксируйте голову кошки: осторожно положите руку под подбородок, большой палец — с одной стороны челюсти, остальные пальцы — с другой.

**6** Когда будете готовы начать, осторожно запрокиньте кошке голову.

**7** Убедитесь, что глаза кошки чистые.

**8** Если есть какие-то выделения, промойте глаза специальным раствором или теплой водой. Нанесите немного раствора на ватный тампон (отдельный для каждого глаза) и аккуратно протрите вокруг глаз.

**Справа:** капли назначает ветеринар. Держите на этот случай ватные тампоны и диски в кошачьей аптечке первой помощи.



## ВАЖНО

Не забудьте положить в аптечку новые расходные материалы взамен использованных.



9

**9** Держите кончик пипетки или носик бутылочки в 2,5 см от глаза. Не касайтесь пипеткой глаза (никакой его части).

**10** Осторожно опустите нижнее веко кошки и закапайте необходимое количество капель в образовавшуюся щель. Не волнуйтесь, если немного промахнетесь: лекарство разойдется по всему глазу без каких-либо действий с вашей стороны.

**11** После того как вы закапали лекарство, подержите кошку, чтобы дать время каплям разойтись по всему глазу. Не трогайте глаз; просто держите кошку неподвижно в течение нескольких минут.

## ВАЖНО

Кошке наверняка не понравится процесс закапывания глазных капель, но у вас должна быть возможность делать это дома.



11

# КАК ПОМЫТЬ КОШКУ ЛЕЧЕБНЫМ ШАМПУНЕМ

Кошки, как правило, очень чистоплотные животные. Они регулярно вылизываются, и им не нужно мыться, как людям. Если ваша кошка не является исключением и ей не нравится купаться, не нужно купать ее без необходимости. Однако бывают случаи, когда кошку нужно помыть лечебным шампунем, например когда она извалялась в чем-то липком или плохо пахнущем.

Большинству кошек очень не нравится купаться, и они нервничают, оказываясь в ванне. Однако, когда процедура необходима, есть способы снизить стресс как для вас, так и для вашего питомца. Выберите время, когда кошка расслаблена и спокойна, например после еды.

Прежде чем купать кошку, уберите колтуны и спутанный мех, это значительно облегчит процесс. Можно перед купанием подрезать

когти (с. 24), если вы считаете, что она может царапаться в стрессовой ситуации. Хорошо, если есть кто-то, кто может вам помочь. Наденьте плотную одежду с длинными рукавами, чтобы кошка вас не исцарапала. При необходимости используйте перчатки.


Заманить кошку в ванну можно игрушками; пока кошка играет, долейте немного воды в ванну, это хороший способ дать ей привыкнуть к воде.

**Ниже:** если кошка изо всех сил пытается выбраться из ванны, не боритесь с ней и сделайте перерыв; если на шерсти осталось мыло, попробуйте смыть его позже.



## ВАЖНО

Не мойте кошку шампунями и кондиционерами для людей.



## САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КУПАНИЯ КОШКИ

- Подходящая ванна (таз, большое ведро или раковина).
- Специальный шампунь для кошек (и кондиционер, если необходимо).
- Полотенца.
- Кусок ткани.
- Ковшик или кувшин.
- Кошачья шлейка.
- Щетка.



Емкость для купания



Полотенце



Щетка



Большое ведро



Зоошампунь



Кувшин

**Справа:** если ваша кошка пытается сбежать, наденьте на нее шлейку, пока купаете.



## КАК НАНОСИТЬ ЛЕЧЕБНЫЙ ШАМПУНЬ

Для лучшего результата следуйте инструкции:

- 1** Положите коврик или полотенце на дно ванны, чтобы кошка не скользила.
- 2** Закройте дверь в ванную комнату и не пускайте туда других животных.
- 3** Налейте в ванну достаточное количество теплой воды (от 5 до 10 см).
- 4** Наденьте на кошку шлейку, если она у вас есть.
- 5** Перед тем как опустить кошку в ванну, проверьте, чтобы вода была негорячей.
- 6** Чтобы снизить стресс, говорите с кошкой спокойным, мягким голосом.
- 7** Не кричите и не ругайте кошку. Если она сильно сопротивляется, остановитесь и повторите попытку в другой день или обратитесь за советом к ветеринару.



**Выше:** спокойно разговаривайте с кошкой, наполняя ванну; воды должно быть немного, от 5 до 10 см.



8

**8** Если кошка нормально переносит купание, полейте на нее из ковшика. Проточная вода из-под крана может вызывать у нее сильную тревогу.



9

**9** Возьмите немного шампуня и нанесите его на грязные участки шерсти (или от шеи вниз, если необходимо вымыть кошку целиком).


**10** Втирайте шампунь в шерсть аккуратно, чтобы не попасть в глаза, уши, нос и рот.

**11** Тщательно смойте шампунь, чтобы его не осталось на шерсти. Для этого либо выньте кошку из ванны и наполните ванну чистой водой, либо вымойте кошку душевой насадкой, если она не боится.

**12** Чтобы вымыть кошке морду, аккуратно протрите ее влажной тканью, не касаясь глаз и рта.

**13** Аккуратно высушите кошку: промокните воду с шерсти полотенцем или слегка потрите ее.

**14** Если полотенце насквозь промокло, возьмите сухое.



15

**15** Если у вас длинношерстная кошка, расчешите ей шерсть, а затем промокните оставшуюся воду сухим полотенцем. Можно использовать фен с теплым (не горячим) воздухом, если кошка не боится.

**16** Обязательно дайте кошке лакомство, погладьте ее и поиграйте с ней — это поможет закрепить приятные ассоциации с мытьем и облегчит повторное купание.

**Слева:** после мытья аккуратно высушите шерсть кошки полотенцем, убрав как можно больше влаги.



# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ

Если вы выпустили кошку на улицу до стерилизации, велики шансы, что она забеременеет. Кошки способны забеременеть с четырех месяцев, после чего течка у них проходит циклами по 14 дней.

В период течки поведение самки меняется: она трется об пол, метит территорию и издает призывные звуки. Самцы улавливают эти сигналы раньше людей, поэтому к тому времени, как вы заметили перемены поведения, самец, вероятно, уже спарился с кошкой. Кошка может спариться с несколькими самцами, и в помете будут котята от разных отцов.




ВЫСТУПАЮЩИЕ СОСКИ



СПАРИВАНИЕ





## ВАЖНО

Больше информации о беременности, родах и уходе за новорожденными котятками вы найдете на с. 162.

## ПРИЗНАКИ БЕРЕМЕННОСТИ У КОШЕК

Признаков, по которым можно определить беременность в течение первых недель, очень мало. Через пару недель соски становятся более заметными и розовыми. Кошка больше ест, набирает вес, и у нее наполняются молочные железы. В зоомагазинах продают специальный корм для беременных кошек; кормить их следует несколько раз в день, чтобы они достаточно питались.

**Выше:** когда у кошки течка, рядом появляются коты всех мастей, желающие с ней спариться.



**Слева:** к тому моменту, когда вы заметите первые физические и поведенческие признаки беременности, кошка может быть беременна уже не одну неделю.

# КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ КОШКИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Важно знать, как вести себя в чрезвычайной ситуации, даже если эти знания вам никогда не пригодятся. В этом разделе вы найдете рекомендации о том, что делать с кошкой в экстремальных погодных условиях или если в доме пожар. Лучше заранее продумать план действий на случай катастрофы и обсудить его со всеми членами семьи.

## ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ

### Знаете ли вы, где обычно прячется ваша кошка?

Если в доме пожар или произошло стихийное бедствие, кошка, скорее всего, испугается и убежит в одно из укромных мест, где чувствует себя в безопасности. Все в доме должны знать, где кошка любит прятаться. Если вы дружны с соседями, можно и им рассказать об этом. Оставьте им запасной ключ, познакомьте их с кошкой и покажите, где хранится переноска, чтобы они могли спасти кошку, если что-то случится в ваше отсутствие.

### Приучена ли кошка сидеть в переноске?

В чрезвычайной ситуации очень важно посадить туда кошку очень быстро. Необходимо иметь отдельную переноску для каждой кошки, если у вас несколько питомцев, и держать их в удобном месте. Если кошке не нравится переноска, покажите ей, что это безопасное место: играйте с кошкой в переноске и оставляйте в ней лакомства. Положите в переноску подстилку на случай, если кошка сходит в туалет.

### Куда можно отправить кошку?

Подумайте, сможет ли кто-то из друзей или родственников ненадолго приютить кошку, если вам придется эвакуироваться? Где находится ближайшая передержка для животных?

### Если кто-то найдет вашу кошку, сможет ли он связаться с вами?

На случай, если кошка убежит, должна быть возможность идентифицировать ее. Купите ей ошейник с биркой, а также чипируйте ее в ветеринарной клинике. Это полезно, даже если кошка домашняя. Вряд ли она убежит в нормальной ситуации, но в чрезвычайной такой риск существует. Кошка может не найти дорогу домой, и наличие микрочипа и информация на бирке помогут вам найти своего питомца.

-  **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ** с. 131
-  **ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОШКА ЗАХЛЕБНУЛАСЬ** с. 147
-  **ПОМОЩЬ ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ** с. 117
-  **ОБРАБОТКА И ПЕРЕВЯЗКА НЕГЛУБОКИХ РАН** с. 76

## АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

**Ниже:** продумайте план заранее и, чтобы в чрезвычайной ситуации все прошло гладко, держите наготове комплект вещей, необходимых для эвакуации кошки и последующего содержания.




Вода на семь дней

- Базовая аптечка первой помощи.
- Сухой корм в водонепроницаемом контейнере из расчета на семь дней (меняйте его примерно каждый месяц, чтобы он оставался свежим).
- Вода в бутылке из расчета на семь дней.
- Недавняя фотография кошки, которую можно показать спасателям, чтобы они ее идентифицировали.
- Бумажные полотенца / наполнитель для лотка.
- Импровизированный лоток, например одноразовая форма для выпечки.
- Лекарства, необходимые вашей кошке.
- Контактная информация ветеринарной клиники и приюта для животных.



Лекарства



Импровизированный лоток



Базовая аптечка первой помощи



Наполнитель для лотка

## ПОЖАР

У кошек отлично получается опрокидывать вещи, и, к сожалению, они нередко роняют свечи и другие горячие предметы. Как вариант, можно перестать пользоваться дома свечами. Но если вы все-таки планируете их зажигать, то не оставляйте без присмотра или тушите, когда выходите из комнаты. Если, лазая на кухне, кошка может случайно включить плиту, нужно установить защитные колпачки на ручки плиты. В качестве последней меры предосторожности наклейте на окна наклейки, чтобы сообщить пожарным о том, сколько у вас питомцев. Приклейте их с обеих сторон дома.

Если случится худшее и кошка попадет в огонь, как только перенесете ее в безопасное место, проверьте, все ли с ней в порядке. У спасателей

**Ниже:** если кошку спасли на пожаре, обязательно покажите ее ветеринару, даже когда у нее нет никаких признаков травмы или болезни.

**На соседней странице:** паводковая вода загрязнена и часто содержит опасные химические вещества; если у вас в регионе наводнение, сделайте все возможное, чтобы кошка находилась дальше от воды.

могут быть кислородные маски для домашних животных, поэтому, если у кошки возникли проблемы с дыханием, обязательно обратитесь к ним за помощью. Даже если кошка выглядит совершенно здоровой, покажите ее ветеринару, чтобы убедиться, что у нее нет травм и она не надышалась дымом.






## НАВОДНЕНИЕ

Если вы живете в зоне подтопления, заранее продумайте план действий. Для начала выясните, разрешают ли местные власти находиться в аварийных укрытиях с кошкой. Если нет, позаботьтесь о том, чтобы кошка в чрезвычайной ситуации осталась с друзьями или членами семьи. Если вы узнали о приближении наводнения, можно подготовить дом к тому, чтобы кошка было безопасно находиться внутри. Паводковая вода загрязнена, кошкам опасно пить ее и мокнуть в ней. Поставьте всю бытовую химию повыше, чтобы вредные вещества не оказались в воде. Возьмите наверх, в безопасное место, все необходимое для кошки: еду, подстилку, миски и аптечку первой помощи, а также ветеринарные документы и лоток. Захватите на случай возможной эвакуации переноску. Чтобы кошка сохраняла спокойствие во время предупреждения о наводнении, возьмите с собой ее

игрушки. Если вас эвакуируют, подумайте о том, как безопасно перевезти с собой животное. Приготовив все заранее, вы будете меньше волноваться в чрезвычайной ситуации. В случае эвакуации, подумайте, где можно побыть с кошкой: в аварийном укрытии или гостинице, куда пускают с животными. Упаковывая вещи, убедитесь, что взяли все необходимое для своей кошки, сверившись со списком на с. 105. Во время наводнения, если у вас нет другого выхода, кроме как оставить кошку в доме, лучше всего закрыть ее в комнате наверху. Убедитесь, что у нее достаточно еды и воды. В двери оставьте записку, что в доме находится кошка. Обратитесь в зоозащитную организацию или к местным органам власти и попросите их совета. Если вы живете в одноэтажном здании, оставьте кошке возможность эвакуироваться, не оставляйте ее запертой.



## ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Если вы живете в зоне, где возможно землетрясение, важно иметь план на такой случай, поскольку землетрясение нередко происходит внезапно. Если вы знаете, что оно вот-вот начнется, посадите кошку в переноску: там она будет в безопасности в случае падения обломков. Если у вас нет времени сажать кошку в переноску, оставьте ее в доме, но дайте возможность свободно двигаться, не пытайтесь ее поймать. Во время землетрясения в первую очередь думайте о себе. Опуститесь на землю, найдите укрытие и держитесь за что-нибудь. Кошка, скорее всего, найдет безопасное место и спрячется; в подобной стрессовой ситуации она вряд ли дастся в руки.

**Выше:** даже если погодные условия изменятся, стихийное бедствие обязательно закончится сразу; не выпускайте кошку из дома, пока на улице не будет безопасно.

Как только землетрясение закончится, в доме будут сломаны вещи, на полу могут лежать острые осколки стекла. Постарайтесь сделать так, чтобы кошка не бродила в таких местах. Прежде чем выпускать кошку на улицу, убедитесь, что там нет острых предметов и луж из разлитых химикатов.

## СИЛЬНЫЙ ШТОРМ ИЛИ ТОРНАДО


Чтобы кошка была в безопасности во время торнадо или сильного шторма, она должна быть дома, когда стихийное бедствие начнется. Кошка может спрятаться, когда заметит приближение суровых погодных условий. Но безопаснее будет находиться в доме, так вы быстрее сможете эвакуироваться вместе с ней, если понадобится. Если есть предупреждение о торнадо, заверните кошку в полотенце или наволочку, положите ее в переноску и отнесите в безопасное место: подвал, комнату без окон или шкаф. Возьмите с собой аварийный комплект кошки.




Если возможно, поставьте переноску под прочный предмет мебели. Не выпускайте кошку, пока не скажут, что снаружи безопасно.

**Выше и ниже:** после урагана остаются острые предметы, разлитые химикаты, нестабильные поверхности и неисправная проводка; все это опасно для кошки, поэтому не выпускайте ее из дома, пока не убедитесь, что опасность миновала.





3




**ЭКСТРЕННАЯ  
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ**

# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ИСПЫТЫВАЕТ ЛИ КОШКА БОЛЬ

У кошек есть уникальная способность скрывать боль. Пока они жили в дикой природе, это был полезный навык: животное, показывающее, что ему больно, дает понять хищникам, что оно ранено и может стать легкой добычей. Умение скрывать боль было залогом выживания. Однако для владельцев кошек это недостаток, поскольку им сложно понять, когда у кошки травма или она больна.

Если ваша кошка хромает или вы заметили у нее открытую рану, нетрудно предположить, что ей больно. Для менее очевидных травм есть явные подсказки, на которые нужно обратить внимание. Будучи владельцем кошки, вы, как никто другой, знаете, как обычно ведет себя ваш питомец, как двигается, в каком пребывает настроении. Так что вы, вероятно, первым заметите, если с кошкой что-то не так.



**Справа:** если вы заметили у кошки признаки боли — физиологические или поведенческие, — покажите ее ветеринару.

Телесные повреждения

## ИЗМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ

Если кошке больно, могут меняться:

- голос и манера мяукать;
- аппетит;
- поведение;
- движения;
- манера вылизываться;
- мочеиспускание и дефекация;
- движения глаз;
- поза и осанка.

Отдергивается при прикосновениях

Снижение активности и увеличение времени сна

Желание спрятаться

Прищуренные или закрытые глаза, расширенные зрачки

Опущенная голова

Избегает людей

Агрессия


Рычание, стоны или даже мурлыканье

Учащенное или неглубокое дыхание

Снижение аппетита и количества потребляемой жидкости

Учащенное сердцебиение

Припухлости и отеки





## ПРИЗНАКИ БОЛИ У КОШКИ

**Агрессивное поведение:** испытывая боль, кошки чаще кусаются и царапаются. Так делают все кошки, независимо от обычного поведения. Они агрессивно реагируют на касание (или даже предполагаемое касание) болезненного места.

**Избегание:** если кошка стала чаще прятаться, у нее может что-то болеть.

**Вокализация:** мурлыканье и другие звуки могут быть признаком боли у кошек. Сюда же относятся рычание и стоны.

**Изменение позы:** если кошка постоянно сидит на месте, ссутулившись и опустив голову, вероятно, ей больно.

**Изменение глаз:** когда кошке больно, у нее могут расширяться зрачки. Если болят глаза, зрачок бывает больше или меньше, чем обычно, в зависимости от проблемы. Яркий признак наличия боли — прищуренные или закрытые глаза, покраснения, а также попытки уйти с яркого света.

**Смена повадок:** если кошке больно, она чаще и дольше вылизывает то или иное место. Или, наоборот, не умывается так часто, как раньше.

**Реакция на прикосновение:** если вы дотронетесь до болезненного места, то по реакции поймете, что кошке больно.

**Изменение подвижности:** в зависимости от причины, кошки, испытывающие боль, двигаются иначе или меньше, чем обычно. Сравните ее походку с прежней, оцените, изменилась ли скорость. Прыгает ли она так же, как раньше? Или еле двигается?

**Необщительность:** иногда, если кошке больно, она реже идет к людям и другим животным, меньше играет. Она может перестать ластиться к людям.

**Проблемы с туалетом:** кошке, которая испытывает боль, может быть трудно мочиться и испражняться, поэтому иногда она ходит мимо лотка. Вы заметите, что она больше напрягается при попытке помочиться.

**Слева:** часто, испытывая боль, кошка прищуривается или закрывает глаза; следите за изменениями в движениях и выражении морды кошки.

**Снижение активности:** если кошке больно, она становится менее активна, меньше играет и бегает, больше спит.

**Изменения на теле:** посмотрите, нет ли у кошки очевидных признаков боли, например припухлости или отеков.

**Снижение аппетита:** если кошке больно, она ест и пьет меньше, чем обычно. Чаще так бывает, когда у нее болят зубы или рот.

**Дыхание:** если вы заметили, что кошка дышит не так, как обычно, например чаще, более поверхностно или, наоборот, глубже, есть вероятность, что ей больно.

**Сердцебиение:** учащение сердцебиения может быть признаком боли у кошки. Погладьте кошку и обратите внимание, как бьется сердце. Если вы подозреваете, что есть проблема, проверьте у нее пульс.

**Другие изменения:** вы, как никто, знаете повадки своей кошки. Если вы не можете определить, что именно не так, но заметили, что кошка ведет себя странно, лучше всего показать ее ветеринару.

Если вы заметили, что кошка ведет себя необычно, отвезите ее в ветеринарную клинику для обследования. Если у кошки что-то болит, врач предложит план лечения или подскажет, что нужно поменять в образе жизни — вашем или кошки.

## КАК ОБЛЕГЧИТЬ БОЛЬ

- В зависимости от типа боли можно изменить условия проживания кошки, тем самым облегчив ее боль. Например, если проблема не позволяет ей нормально двигаться, можно расположить еду, воду, подстилку и лоток так, чтобы до них было легче добраться. Убедитесь, что кошке комфортно залезать в лоток. Ей будет легче, если лоток будет большей площади и с низким бортиком.
- Если у вас несколько домашних животных, посмотрите, как кошка ладит с остальными. Может, ее нужно оградить от слишком грубой игры или беготни, пока у нее что-то болит.
- Если вы лечите кошку дома, записывайте свои наблюдения, отмечая все изменения в поведении, движениях или распорядке дня. Посетите ветеринара и обсудите с ним свои наблюдения.

## ВАЖНО

Не давайте кошке никаких лекарств без рекомендации ветеринара!



# СОСТОЯНИЕ ШОКА

Если кошка находится в шоковом состоянии, это экстренная ситуация, означающая, что у кошки нарушено кровоснабжение. Такая ситуация может привести к летальному исходу, поэтому необходимо немедленно обратиться в клинику и описать состояние кошки.

Если у кошки бледные или белесые десны, холодные лапы, частое, поверхностное дыхание частотой более 30 вдохов и выдохов в минуту или слабый пульс, у нее может быть шок.

**Ниже:** если вы заметили хотя бы один из признаков шока, не забывайте, что он может быть показателем серьезной проблемы.



БЛЕДНЫЕ ДЕСНЫ

Из-за оттока крови от носа и рта десны становятся белесыми или бледными



СЛАБЫЙ ПУЛЬС

Нехватка кислорода в мозге — причина обморока или сильной слабости

Кошка вялая и сонная, не реагирует на имя или игрушки

Расширенные зрачки и взгляд в одну точку

Нижние части лап холодные



## ПОМОЩЬ ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ

Если вы подозреваете, что у кошки шоковое состояние, сделайте следующее:



3



6

- 1 Позвоните в свою ветеринарную клинику, сообщите, что везете к ним кошку.
- 2 Положите кошку на бок на полотенце либо надежно поддерживайте ее прямо в вертикальном положении.
- 3 Голова у кошки должна быть вытянута, необходимо дать ей возможность дышать.
- 4 Обхватите рукой голову кошки и вставьте большой и указательный пальцы за клыками.
- 5 Аккуратно запрокиньте голову кошки.

- 6 Откройте ей рот, разводя большой и указательный пальцы. Вытяните язык, чтобы он не блокировал дыхательные пути.
- 7 Разместите заднюю часть туловища кошки на подушке или сложенном полотенце, чтобы она была выше головы.
- 8 Посмотрите, бледные ли десны у кошки. Десны светлее обычного — признак шока.
- 9 Заверните кошку в одеяло или полотенце, рядом по возможности положите бутылку с горячей водой, чтобы согреть животное.



Если у кошки рана, перелом или другая травма, помассируйте ей лапы, чтобы восстановить циркуляцию крови

### ВАЖНО

Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику!



# УДУШЬЕ

Если кошка задыхается, необходимо удерживать ее, чтобы она еще больше не навредила себе. Если у нее что-то намоталось на шею и это мешает ей дышать, аккуратно удалите предмет с помощью ножниц.

## ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УДУШЬЯ

Удушье – нечастая проблема у кошек, однако, если что-то застрянет у животного в горле или обмотается вокруг шеи, вам нужно знать, как помочь.

### Ошейники и банданы

Не используйте ошейники с пряжками, острыми краями или эластичными вставками; ошейник должен быстро сниматься, поэтому лучше всего подойдет защелкивающаяся пряжка. Он не должен быть слишком тугим; чтобы проверить это, просуньте два пальца под ошейник. Ничего не привязывайте кошке на шею.

### Кости

Не давайте кошке есть кости. Как сырые, так и вареные, они застревают в горле, и кошка может подавиться. Кроме того, кости из готовых блюд могут расколоться, что увеличивает риск удушья.

### Игрушки и нитки/пряжа

Следите за состоянием кошачьих игрушек, убирайте торчащие нитки и все, чем кошка может подавиться. Не оставляйте кусочки веревки или ниток в доме, а также не позволяйте кошке забираться в мусорное ведро.

### Комочки шерсти

Чтобы кошка не подавилась комочками шерсти, регулярно вычесывайте ее. Пусть у кошки всегда будет доступ к большому количеству воды, а также достаточно клетчатки в рационе. (Желательно также использовать мальт-пасту. *Прим. науч. ред.*)



ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ИГРУШКИ



НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ


## ВАЖНО

На новогодней елке всегда есть мишура и украшения, привлекающие внимание любопытных кошек. Они загутываются в гирляндах, дождике и ленточках. Не оставляйте свою кошку без присмотра в комнате, где стоит украшенная елка.




КОСТИ

**Слева и ниже:** предметы, попавшие в горло кошке или намотанные на шею, становятся причиной удушья. Если кошка кашляет, пускает слюни или трогает морду, вероятно, она подавилась.



ОШЕЙНИКИ И БАНДАНЫ



Рвотные позывы

Слюни или пена

Кашляет


Трогает лапами морду

## КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ЗАСТРЯЛО У КОШКИ В ГОРЛЕ

Чтобы посмотреть, застряло ли что-то у кошки в горле, и вытащить это, сделайте следующее:



**1** Откройте кошке рот.



**2** Вытащите язык наружу и загляните внутрь.



**3** Если вы видите застрявший предмет и он не слишком глубоко, удалите его длинным пинцетом.



Не удаляйте острые или глубоко застрявшие предметы


**4** Если предмет застрял в задней части горла и вы не можете его достать или вообще не видите, не пытайтесь залезть в горло кошке пальцами. Вы можете случайно протолкнуть предмет еще глубже.

### ВАЖНО


Если вы не можете удалить предметы, мешающие кошке дышать, немедленно отвезите ее в ветеринарную клинику.

## КАК ПОМОЧЬ КОШКЕ ПРИ УДУШЬЕ

Если кошка без сознания и не дышит, можно воспользоваться приемом Геймлиха:




Положение рук для приема Геймлиха



**1** Прижмите кошку спиной к своему животу, подняв ей голову.

**2** Найдите мягкое, полое место под ребрами, область размером с человеческий кулак.



**3** Нажмите рукой на эту часть 2–3 раза, чтобы движение шло вверх (толкая в направлении своего живота).

**4** Еще раз проверьте, есть ли во рту посторонние предметы.

### ВАЖНО

Если это не сработает, проверьте сердцебиение. Если пульс отсутствует, начинайте сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Положите кошку на бок и осторожно, но твердо и резко нажимайте на ее грудь со скоростью около 120 нажатий в минуту.

Даже если вам удастся удалить предмет, которым подавилась кошка, все равно следует отвезти ее к ветеринару, так как могут быть повреждены дыхательные пути.



Если у кошки пропал пульс, начинайте СЛР.

**+** РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА с. 125

# РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


Если кошка без сознания и не дышит, необходимо начать реанимацию.

Реанимация — это метод «перезапуска» сердца и дыхания животного. Проведение реанимации дает время на то, чтобы доставить кошку к ветеринару. Если получится, можно провести реанимацию по телефону под руководством врача по дороге в ветеринарную клинику.

**Ниже:** всегда держите дома переноску для кошки на случай, если срочно понадобится везти ее в клинику.

## ВАЖНО

Если вы обнаружили, что кошка без сознания и не дышит, незамедлительно позвоните в ветеринарную клинику и следуйте назначениям специалиста.





**Выше:** если кошка без сознания, положите ее на бок и вытащите язык наружу, чтобы он не блокировал дыхательные пути (см. с. 124).

Сердце кошки продолжает биться еще несколько минут после остановки дыхания. Необходимо начать реанимацию, как только вы увидели, что кошка не дышит (с. 124). Если сердце кошки останавливается, нужно сделать закрытый массаж сердца (с. 125).

## ВАЖНО

Если вам кажется, что кошка умерла, позвоните в ветеринарную клинику. Там смогут констатировать смерть и посоветовать, что делать дальше.

## ПРИЗНАКИ СМЕРТИ

Есть несколько способов проверить, спит кошка или умерла.

- Позовите кошку по имени, как будто приглашаете ее к миске.
- Проверьте, дышит ли кошка (см. п. 1, с. 124).
- Проверьте, открыты ли у кошки глаза и как выглядят зрачки; если кошка мертва, глаза будут открыты, а зрачки не будут реагировать на свет, оставаясь неподвижными и расширенными.
- Проверьте пульс у кошки (см. вставку на с. 121).
- Проверьте, есть ли трупное окоченение: если тело кошки жесткое, негибкое, вполне вероятно, она скончалась.

## РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ

Если вам кажется, что кошка не дышит, сделайте следующее:



**1** Проверьте, есть ли признаки дыхания; для этого подержите рядом с ноздрями что-то легкое, например перышко, и посмотрите, двигается ли оно.



**2** Если кошка действительно не дышит, положите ее на бок.



**3** Откройте кошке рот.




**4** Вытащите язык наружу. Загляните внутрь, посмотрите, что может мешать дыханию (предмет или сгусток крови).



**5** Держите рот кошки закрытым и вдуйте воздух ей в нос с частотой 10 выдохов в минуту.

## РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА

Если кошка не пришла в себя после п. 5, сделайте следующее:



**1** Проверьте сердцебиение у кошки.



**2** Если сердце не бьется, нажимайте на грудную клетку за передними лапами с частотой два раза в секунду.



**3** Через каждые 15 нажатий дважды подуйте в нос кошке. Продолжайте в течение трех минут.



### ВАЖНО

После попытки реанимации незамедлительно доставьте кошку в клинику.

# ПЕРЕЛОМЫ


Если вам кажется, что у кошки перелом кости, не пытайтесь самостоятельно наложить шину или гипс: кошке будет больно, и можно только усугубить проблему.


Чаще всего кошки ломают конечности, челюсти, ребра, хвост и таз. Признаками являются неспособность шевелить травмированной частью тела или опираться на нее, боль, отек, неестественное положение этой части тела, а иногда и кровотечение. Если сломаны ребра, кошке может быть сложно дышать, а если челюсть — у нее могут течь слюни и быть сломаны зубы.

**Справа и ниже:** если вам кажется, что у кошки перелом, обездвижьте травмированную часть тела и немедленно отвезите кошку к ветеринару.



Действуя быстро, можно спасти лапу и не доводить до ампутации





## ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ИЛИ РАНА: ЧТО ДЕЛАТЬ

Если перелом открытый, то есть вы видите открытую рану и разрыв кожного покрова, постарайтесь остановить кровотечение с помощью полотенца, марлевой повязки или куска ткани и, если возможно, наложите повязку на рану. Не пытайтесь промыть рану самостоятельно.

### ВАЖНО

Как можно быстрее отвезите кошку к ветеринару. Для транспортировки используйте переноску или коробку с открытым верхом, выстеленную полотенцем. Травмированную часть тела необходимо обездвижить.

**Выше:** если при переломе пострадали кожные покровы, постарайтесь остановить кровотечение, обездвижьте травмированную часть тела и срочно отправляйтесь к ветеринару.

## ПЕРЕЛОМЫ ХВОСТА

В результате несчастного случая могут возникнуть трещины, переломы или вывихи хвоста.

- Травмы, расположенные ближе к кончику хвоста, как правило, заживают без вмешательства.
- Если кости раздроблены, ветеринар может ампутировать конец хвоста.
- Если у кошки произошел перелом костей у основания хвоста, нужно немедленно отвезти ее в ветеринарную клинику.




**Выше справа:** переломам подвержены все части хвоста; независимо от места травмы, у основания или на кончике, отвезите кошку в ветеринарную клинику.

- ✚ ТРАВМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП И ПРОЧЕ с. 138
- ✚ ТРАВМЫ ХВОСТА с. 141
- ✚ КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ с. 137
- ✚ ПОМОЩЬ ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ с. 117

# ТЕПЛОВОЙ УДАР

При тепловом ударе у кошек наблюдаются слабость, слюнотечение, учащенное дыхание, дезориентация, тревога и обморок.


Если вам кажется, что у кошки тепловой удар, переместите ее в прохладное место и проверьте температуру, ощупав ее тело. Измерение температуры с помощью термометра лучше оставить профессионалам.



ОХЛАЖДЕНИЕ

**Выше:** если вы заметили признаки теплового удара у своей кошки, примите меры, чтобы постепенно снизить температуру ее тела.

Желание лечь на прохладную поверхность



Сильное волнение

Одышка, слюнотечение

Потные лапы


## КАК СНИЗИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА

Чтобы снизить температуру тела кошки, сделайте следующее:

- 1 Смочите ей шерсть прохладной водой (но ни в коем случае не холодной и не льдом).
- 2 Если есть возможность, положите ее перед вентилятором.
- 3 Следите за температурой, убедитесь, что кошке становится прохладнее.


### ВАЖНО

Если кошке не становится лучше, немедленно отвезите ее в ветеринарную клинику.



# АБСЦЕССЫ

Если кошку покусали или поцарапали другие кошки либо собаки, может образоваться абсцесс (полость, заполненная гноем).



**Выше:** чтобы в домашних условиях оказать первую помощь кошке при нарыве, делайте горячий влажный компресс несколько раз в день, пока нарыв не заживет.

## ПРИЗНАКИ АБСЦЕССА

Если кошка занесла в рану инфекцию, отвезите ее в клинику. Признаки инфекции в ране:


- отек;
- лихорадка;
- гнойные выделения;
- нарывы.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно вскрыть абсцесс!

## КАК СДЕЛАТЬ КОМПРЕСС\*

Чтобы наложить компресс, сделайте следующее:

**1** Тупоконечными ножницами аккуратно обрежьте шерсть вокруг нарыва и наложите горячий влажный компресс, чтобы запустить процесс дренирования. Наденьте перчатки, чтобы не прикасаться к гною.



**2** Оставьте компресс примерно на 20 минут и повторяйте процедуру 2–3 раза в день, пока гной не выйдет полностью.

**3** После этого промойте и обработайте рану (с. 76).

\* Такие нарывы редко заживают сами. Лучшим решением будет сразу же обратиться к ветеринару. *Прим. науч. ред.*

## ВАЖНО

Если вы видите, что абсцесс не проходит и тем более усугубляется в течение трех дней, отнесите кошку к ветеринару.

# ОЖОГИ

Прежде чем осмотреть у кошки ожог, убедитесь, что она в безопасности, пламя потушено, а электрические устройства выключены.

Если кошка обожглась, ей, скорее всего, очень больно, поэтому подходите к ней медленно и осторожно. Ожог можно опознать по опаленной или отсутствующей шерсти, красным, черным или белым пораженным участкам или волдырям.

## КЛАССИФИКАЦИЯ ОЖОГОВ

С помощью этих описаний вы сможете определить тип ожога у кошки. Обратите внимание, что признаки могут проявиться через 2–3 дня.

### Степени тяжести

**Первая степень:** слои кожи не повреждены, но шерсть может отсутствовать. Кожа краснеет; кошка испытывает несильную боль.

**Вторая степень:** видны волдыри, а также покраснение, свидетельствующее о том, что повреждено более одного слоя кожи. Кошка испытывает боль.

**Третья степень:** повреждение тканей под кожей. Кожа вокруг ожога черная на вид.

### ВАЖНО

Если у кошки ожог второй или третьей степени, она может впасть в состояние шока, также есть риск инфицирования.



**Выше:** опаленные усы и шерсть — верные признаки того, что кошка обожглась; определите источник ожога и отвезите кошку в ветеринарную клинику.

### Виды ожогов

**Химические ожоги:** проявляются иногда через несколько часов — как правило, в виде белесости на коже.

**Термические и электрические ожоги:** обычно проявляются незамедлительно; кожа в месте ожога темнеет. Ожоги средней тяжести проявляются в течение нескольких дней.

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ

### Как лечить химические, термические и электрические ожоги у кошек

#### Химические ожоги

Если кошка получила химический ожог, действуйте следующим образом:

- Наденьте перчатки или защитную одежду, чтобы самим не пострадать от химии.
- Промойте рану прохладной водой в течение 20 минут (добавьте небольшое количество средства для мытья посуды, если химическое вещество на масляной основе, а затем смойте водой). Можно погрузить место ожога в прохладную воду или положить на него влажную ткань и поливать ее водой.
- Если ожог во рту или в глазу, также необходима промывка водой в течение 20 минут.

#### При ожогах первой степени:

- Через 20 минут промывания аккуратно промокните участок сухой чистой тканью.
- Не трите пораженный участок и не наносите никаких мазей или масел.
- Отнесите кошку к ветеринару.

#### При ожогах второй и третьей степени:

- Оставьте влажную ткань на пораженном участке.
- Покажите кошку ветеринару.
- Возьмите с собой емкость с химией.



Если кошка испачкалась химией, проверьте, нет ли следов вещества во рту, поскольку она могла его проглотить

#### Термические и электрические ожоги

Если кошка обожглась обо что-то горячее или об электроприбор, выполните следующее:

Промойте пораженный участок прохладной водой в течение 20 минут. Можно погрузить место ожога в прохладную воду или приложить влажную ткань на пораженный участок и поливать ее водой.

#### При ожогах первой степени:

- Через 20 минут аккуратно промокните участок сухой чистой тканью.
- Не трите пораженный участок и не наносите никаких мазей или масел.
- Покажите кошку ветеринару.

#### При ожогах второй и третьей степени:

- Оставьте влажную ткань на пораженном участке.
- Покажите кошку ветеринару.

## ВАЖНО

Важно промыть обожженную область в прохладной воде в течение 20 минут. Вода снизит температуру кожи и не усугубит ожог. Кроме того, промывание раны предотвратит инфицирование и поможет заживлению.



Наденьте защитные перчатки

# УКУСЫ ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ

Если вам кажется, что вашу кошку ужалило насекомое, посмотрите, есть ли покраснение, отек и зуд. В некоторых случаях кошка может даже потерять сознание.

Кошки любопытны, и если вы разрешаете своей кошке выходить на улицу, то ее практически наверняка покусают насекомые или другие животные. Попробуйте определить, кто именно укусил или ужалил кошку, от этого зависит, что именно нужно делать.

**Ниже:** если кошку ужалила пчела, понаблюдайте, не возникнет ли аллергическая реакция (см. противоположную страницу).

## УКУСЫ ЗМЕЙ


- Если вы увидели змею, укусившую кошку, попробуйте определить, что это за змея, если это безопасно.
- Не прикасайтесь к месту укуса.
- Не охлаждайте и не дренируйте рану. Как можно скорее покажите кошку ветеринару.



## ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ НАСЕКОМОГО

Если вы считаете, что у кошки шок, выполните действия, описанные на с. 117, или следуйте инструкции:

- 1** Определите, где находится жало. Если в области рта или горла, отек может быть сильным и вызовет затруднение дыхания. Если это произошло, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.
- 2** Если вы видите жало, попробуйте определить, есть ли на нем мешочек с ядом. Для этого возьмите лупу и вытащите жало пинцетом, не касаясь мешочка с ядом. Если вы сожмете мешочек, кошка получит бо́льшую дозу яда.
- 3** После удаления жала сделайте холодный компресс, чтобы уменьшить отек.
- 4** Если кошку ужалила пчела, сделайте пасту из пищевой соды и воды и нанесите на место укуса. Это поможет нейтрализовать яд. Если кошку ужалила оса, обработайте место укуса разбавленным уксусом или лимонным соком.
- 5** Наблюдайте за кошкой, чтобы понять, есть ли у нее аллергическая реакция на укус. Она проявляется как отек горла, затрудненное дыхание, рвота или обморок. Если есть какие-то признаки аллергии, ситуация считается чрезвычайной и следует немедленно обратиться к ветеринару.



**Выше:** если кошку ужалила пчела, с этим часто можно справиться в домашних условиях, но важно понимать, куда именно ужалили животное, поскольку одни укусы опаснее других.

### ВАЖНО

Не давайте кошке никаких человеческих лекарств. Если вы считаете, что необходимы медикаменты, отнесите кошку к ветеринару.

# ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ДРАКЕ


Если вам кажется, что кошку укусили или поцарапали другие кошки и есть заражение, отнесите ее в клинику, чтобы ветеринар назначил антибиотики.

## КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ДРАКИ

Лучший способ предотвратить укусы и болевые травмы — не выпускать кошку на улицу. Иногда на месте царапины или прокуса образуется абсцесс (см. с. 129), но это бывает нечасто. Дома проконтролируйте, чтобы на столах не было острых предметов. Если у вас несколько домашних животных, обязательно следите за их отношениями.

## ВАЖНО

Если вас укусила кошка и есть рана, незамедлительно промойте ее и обратитесь за медицинской помощью.




**Ниже:** если вы выпускаете кошку на улицу, она, скорее всего, будет драться с другими кошками и получит травмы.

Кошачья слюна — рассадник бактерий; если какая-то кошка укусила вашу, рану следует промыть; также нужно отвезти животное в клинику, чтобы назначить антибиотики

Если ваша кошка склонна убежать, травмы будут на спине, задних лапах или хвосте

Если ваша кошка неуступчива, травмированы будут морда, уши или шея





Игровые бои обычно длятся до возраста 16 недель

Играющие кошки по очереди выступают охотником и добычей

Если игра становится агрессивной, прекратите ее, хлопнув в ладоши или поставив между дерущимися барьер

Совместная игра — это позитивное поведение; через нее кошка становится менее агрессивной по отношению к другим животным и менее склонной к дракам

Чтобы кошка была социализирована и при этом неагрессивна по отношению к другим кошкам (так меньше шансов получить травму в драке), в раннем возрасте создайте условия положительного общения с другими кошками. Кошки враждебны к тем, кто посягает на их территорию, и, если есть вероятность, что однажды вы заведете вторую кошку, нужно сделать процесс знакомства более плавным и безопасным. Для этого необходимо обучить кошку навыкам взаимодействия с другими животными, пока она еще котенок. Если у вас кот и он особенно агрессивен, может помочь кастрация.

**Выше:** совместная игра — естественное поведение для котят, но будьте осторожны: с возрастом она может перерасти в драку. В этом случае кошки больше не нападают друг на друга по очереди, а все время лидирует одна, более сильная.

Если у вас больше одной кошки, миски для еды и воды, подстилка и лоток должны быть у каждой свои. Можно поставить их в разных частях дома. Кошкам будет комфортнее, если у них будет собственное пространство для лазания и игры.

**+** ПОМОЩЬ ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ с. 117

**+** АБСЦЕССЫ с. 129

**+** ОБРАБОТКА И ПЕРЕВЯЗКА НЕГЛУБОКИХ РАН с. 76

## КАК ЛЕЧИТЬ ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ДРАКЕ

Если у кошки кровотечение, следуйте инструкции на странице напротив. Если рана небольшая, промойте ее (с. 76), а затем перевяжите (с. 77).

Если рана глубокая, отвезите кошку в ветеринарную клинику. Проверьте, нет ли у кошки других ран. Если вы заметили рану от укуса другой кошки, скорее всего, рядом с ней будет еще один прокол кожи. Проколы бывают глубже, чем кажутся на поверхности, поэтому всегда рекомендуется отвезти кошку с такой раной в ветеринарную клинику.

**Ниже:** кусаные раны, полученные в драке, чаще всего воспаляются, поэтому с ними необходимо обращаться в ветеринарную клинику, так как кошке могут понадобиться антибиотики.

## ПРИЗНАКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ

Признаками инфицирования являются:

- отек;
- лихорадка;
- гнойные выделения;
- абсцессы.

## ВАЖНО

Не давайте кошке никаких человеческих лекарств и не мажьте ее кремами и мазями. Если в рану попала инфекция, отвезите животное в ветеринарную клинику.

- +** ПОМОЩЬ ПРИ ШОКОВЫХ СОСТОЯНИЯХ с. 117
- +** ОБРАБОТКА И ПЕРЕВЯЗКА НЕГЛУБОКИХ РАН с. 76



## КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Чтобы кошка не потеряла слишком много крови, сделайте следующее:

- 1 Наложите на рану давящую повязку из чистого полотенца или марли.
- 2 Не снимайте повязку в течение 10 минут.
- 3 Если ткань пропитывается кровью, положите сверху еще один слой. Не снимайте первый, так как это мешает свертыванию крови.
- 4 Если ранена конечность или хвост, перевяжите эту часть тела так, чтобы повязка осталась на месте.
- 5 Положите кошку на бок.

- 6 Если рана находится на лапе, приподнимите травмированную область, чтобы ослабить кровотечение.

### ВАЖНО

Если кровотечение не прекратится через 10 минут, обратитесь в ветеринарную клинику.



### ДОПОЛНЕНИЯ

- Если кошка впала в шоковое состояние, действуйте, как описано на с. 117.
- По возможности наложите повязку так, чтобы обездвижить травмированную часть тела, например если это середина лапы (с. 76). Если такой возможности нет, например кровь идет из раны на морде, крепко придерживайте повязку.
- Если вы заметили отеки, запах, выделения или покраснение, отвезите кошку в ветеринарную клинику.

**Справа:** если кровь пропитала первые слои повязки, наложите поверх еще один слой, это поможет крови лучше сворачиваться.



# ТРАВМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП И ПРОЧИЕ

Если кошка попала в аварию или получила какую-то другую травму, например упала, нужно незамедлительно отвезти ее в ветеринарную клинику.

Даже если на первый взгляд кошка не пострадала, у нее может быть травма, которая не сразу заметна.

## ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

- Если кошка попала в аварию, прежде чем выходить на дорогу, удостоверьтесь, что опасности нет. Если вы получите травму, вам окажут помощь в первую очередь, поэтому для всех будет лучше, если вы будете сохранять спокойствие и действовать обдуманно.

- Если нужно переместить кошку в безопасное место, сделайте это осторожно, стараясь минимизировать движение. Не шевелите голову и позвоночник кошки, положите ее на твердую плоскую поверхность, например на большую книгу в твердом переплете, доску или кусок толстого картона.
- Какова бы ни была причина травмы, позвоните в ветеринарную клинику. Объясните ситуацию и предупредите, что едете. Врачи подскажут вам, как действовать, чтобы помочь кошке.
- Чтобы определить, жива ли кошка, проверьте сердцебиение, положив руку на грудь под левым локтем. В бессознательном состоянии кошки сохраняют «судорожный» рефлекс, глаза могут быть закрыты.
- Сначала проверьте дыхание кошки, а уже потом осмотрите ее на наличие кровотечения и травм.
- Если есть перелом ребер, осколки могут проколоть легкие, поэтому будьте очень осторожны, перекладывая животное.
- Если вам кажется, что кошка перестала дышать, сделайте реанимацию, как описано на с. 124.
- Проверьте, нет ли кровотечения, и наложите на раны давящие повязки из марли или чистой ткани. По возможности не снимайте повязку до приезда в клинику.



**Выше:** прежде чем подойти к кошке, убедитесь, что это безопасно; если нужно переместить ее куда-то, делайте это осторожно, переложив ее на твердую плоскую поверхность.



- Если у кошки есть очевидные колотые раны или сломанные кости, выступающие наружу, закройте рану стерильной марлей или тканью, чтобы предотвратить попадание инфекции. Не пытайтесь наложить шину на сломанные кости. Подробнее о переломах см. с. 126.
- Перевозите кошку, как описано выше, сведя движение к абсолютному минимуму. Если возможно, попросите кого-то поехать с вами, чтобы можно было держать кошку неподвижно во время поездки. Если помочь некому, положите кошку на доску в переноску или, если нет переноски, возьмите пластиковую или картонную коробку.
- Если вы взяли картонную коробку, постелите на дно полиэтиленовый пакет и несколько впитывающих полотенец, чтобы дно коробки не промокло и не сломалось, если кошка помочится.

**Выше:** кошки не всегда приземляются на лапы, но даже если у них это получается, то при падении с высоты всегда есть риск серьезно травмировать конечности.

## ВАЖНО

Отвезите кошку в ветеринарную клинику сразу же после попытки реанимации.

Если вы считаете, что у кошки шок, выполните действия, описанные на с. 117.

Немедленно отвезите животное в клинику, если оно попало в аварию. Даже если вам кажется, что кошка в порядке, последствия травмы могут проявиться позже.

- + ПЕРЕЛОМЫ с. 126
- + РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ с. 124
- + ТРАНСПОРТИРОВКА ПАРАЛИЗОВАННОЙ КОШКИ с. 157
- + ОБРАБОТКА И ПЕРЕВЯЗКА НЕГЛУБОКИХ РАН с. 76
- + КАК СДЕЛАТЬ НОСИЛКИ с. 74

## ТРАВМЫ ГОЛОВЫ

Если вам кажется, что у кошки травма головы, первым делом проверьте, дышит ли она.

**1** Если кошка не дышит, сделайте реанимацию, как описано на с. 124.

**2** Затем проверьте кошке глаза, нос и рот — нет ли кровотечения. Если кровь идет из глаза или видимой раны на голове или морде, наложите давящую повязку из марли или чистой ткани, чтобы остановить кровотечение (см. с. 137).

**3** Посмотрите, не расширены ли зрачки, одинаковы ли они, не застыл ли взгляд.


**4** Даже если нет видимых признаков повреждения, в случае травмы головы отвезите кошку в ветеринарную клинику. Травма может повлиять на работу мозга или привести к летальному исходу.

### ВАЖНО

Если у кошки кровотечение из носа или рта, не нужно его останавливать. Как можно скорее отвезите кошку к ветеринару.

**+** РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ с. 124  
**+** КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ с. 137

**Ниже:** следует серьезно относиться к любой травме головы; если кошка ударилась головой, проверьте глаза, нос и рот на наличие кровотечений и травм.



## ТРАВМЫ ХВОСТА

Если кошка не шевелит хвостом или хвост выглядит не так, как обычно, это может говорить о его повреждении.

- Если у вашей кошки серьезная травма хвоста, необходимо обернуть хвост чистым полотенцем и отвезти кошку в ветеринарную клинику. Когда есть вероятность попадания инфекции в рану, ее должен обработать специалист. Ветеринар сможет дать обезболивающее — это облегчит страдания кошки.
- Если кошка поцарапалась или порезалась и обнажилась кожа, наложите давящую повязку из марли или полотенца, чтобы остановить кровотечение. Не снимайте ее в течение 10 минут. Если ткань пропиталась кровью, наложите сверху второй слой и не убирайте первый, чтобы кровь лучше свертывалась.
- После остановки кровотечения промойте рану (с. 76) и перевяжите хвост (с. 76). Не накладывайте повязку слишком туго. Если хвост кровоточит или опух, кровь не остановилась за 10 минут, а цвет кожи изменился, отвезите кошку в ветеринарную клинику.
- Если кошку тянули за хвост или хвост сломан, есть вероятность повреждения нервов. Если вы видите, что кошка не шевелит хвостом и не поднимает его, когда ходит в туалет, покажите ее ветеринару.

**Справа:** распространенные травмы хвоста делятся на четыре категории: царапины, порезы и рваные раны; абсцессы; переломы; повреждение нервов.



### ВАЖНО

Если кровотечение не прекратится через 10 минут, отвезите кошку в ветеринарную клинику.



### ПРИЗНАКИ ИНФЕКЦИИ В РАНЕ

Если в рану попала инфекция, отвезите кошку в ветеринарную клинику.

Признаки инфицирования раны:

- отек;
- гнойные выделения;
- лихорадка;
- абсцессы.

- +** КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ с. 137
- +** АБСЦЕССЫ с. 129
- +** ПЕРЕЛОМЫ с. 126
- +** ОБРАБОТКА И ПЕРЕВЯЗКА НЕГЛУБОКИХ РАН с. 76

## ТРАВМЫ ЛАП

Если кошка хромает или слишком тщательно вылизывает лапы, вероятно, есть какая-то травма. Из-за нее кошке может быть больно ходить; кроме того, существует риск инфицирования раны, особенно если кошка гуляет на улице.

- Если подушечки на лапах кровоточат, наложите давящую повязку из марли или чистого полотенца. Если ткань пропиталась кровью, наложите сверху второй слой и не убирайте первый, это поможет крови свертываться. Если через 10 минут кровотечение не остановилось, отвезите кошку в ветеринарную клинику.
- Как только кровотечение остановлено, перевяжите рану. Оберните бинтом всю лапу или наденьте на нее детский носок, чтобы повязка не съезжала.
- Если явной раны нет, но лапа опухла, прикладывайте пакет со льдом на 15 минут два раза в день. Если отек не спадет через два дня, отвезите кошку в ветеринарную клинику.

### ВАЖНО

Если кровотечение не останавливается через 10 минут, отвезите кошку в ветеринарную клинику.



**Выше:** внимательно осмотрите рану, проверьте, нет ли в ней посторонних предметов; если что-то обнаружили, отвезите кошку в ветеринарную клинику.

**Слева:** чтобы уменьшить отек, прикладывайте к лапе лед.

**+** ОБРАБОТКА И ПЕРЕВЯЗКА НЕГЛУБОКИХ РАН с. 76

- Если у кошки на лапе абсцесс, сделайте теплый компресс или смочите лапу в теплом солевом растворе (с. 80). Если абсцесс вскрыется, покажите кошку ветеринару.
- Если у кошки травмирована лапа, лучше всего держать ее отдельно от других животных, ограничить движение и дать время, чтобы лапа зажила. Повязки должны быть сухими, меняйте их ежедневно (см. с. 86), отмечая, какие происходят изменения (например, отек, неприятные запахи, влажные выделения или изменение цвета). В случае изменений покажите кошку ветеринару. Возможно, в ране инфекция или в лапу поступает недостаточно крови.

- Если через два дня лапа продолжает кровоточить, а рана не заживает, покажите кошку ветеринару.

**Справа:** травмы подушечек лап болезненны, поэтому ограничьте активность кошки, не выпускайте ее на улицу и держите подальше от других животных.

**Ниже:** если кошка пытаетсялизать рану на лапе, наденьте на нее ветеринарный воротник, чтобы предотвратить инфицирование.



Рана  
на подушечке  
лапы



# ПРОБЛЕМЫ С МОЧЕИСПУСКАНИЕМ

Нарушения мочеиспускания могут свидетельствовать о гораздо более серьезной проблеме со здоровьем. Как только вы заметили, что что-то не так, необходимо обратиться в клинику для диагностики и лечения заболевания.


Заболевания нижних мочевыводящих путей нередко встречаются у кошек и могут привести к летальному исходу. Именно поэтому важно незамедлительно показать кошку ветеринару, если вы заметили признаки, перечисленные во вставке справа.


## КАК ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМЫ С МОЧЕИСПУСКАНИЕМ

- Трудно ли кошке мочиться?
- Кажется ли вам, что кошка испытывает боль при мочеиспускании?
- Часто ли кошка ходит в лоток?
- Есть ли у кошки кровь в моче?
- Не слишком ли мало мочи выделяет кошка?
- Часто ли кошка лижет область гениталий?


Если ответ на любой из этих вопросов «да», существует вероятность проблемы.

**Слева:** вылизывание области гениталий — один из признаков, на который следует обратить внимание, если вы думаете, что у кошки проблемы с мочеиспусканием.





Признаком болезни нижних мочевых путей является частое посещение лотка



**Выше:** болезнь нижних мочевых путей у кошек может быть вызвана образованием в моче кристаллов и мочевых камней — уролитов; они раздражают слизистую мочевыводящих путей и препятствуют нормальному оттоку мочи.



# УТОПЛЕНИЕ

Если это неопасно для вас, вытащите тонущую кошку из воды и убедитесь, что она в сознании. Если кошка без сознания, нужно немедленно принять меры и спасти ей жизнь.

Утопление обычно происходит в четыре этапа. Сначала кошка задерживает дыхание и пытается плыть; затем она начинает дышать в воде и захлебывается; после этого кошку рвет; в конце концов она перестает двигаться, сердцебиение и дыхание замедляются и останавливаются, после чего животное умирает. Если кошка упала в воду и долго

там пробыла, то в течение суток или более у нее будут наблюдаться признаки, связанные с длительным пребыванием в воде: высокий уровень углекислого газа в крови, учащенное дыхание и вода в легких. Даже если кошка не захлебнулась, но была на грани, у нее могут возникнуть проблемы со здоровьем, приводящие к смерти.

**Ниже:** если кошка долгое время находилась в воде, следует как можно скорее отвезти ее в ветеринарную клинику.

Выживет кошка после пребывания в воде или нет, зависит от типа воды и ее температуры



ПЛАВАНИЕ РАДИ ВЫЖИВАНИЯ





## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОШКА ЗАХЛЕБНУЛАСЬ

Если кошка без сознания, выполните следующие действия:

### ВАЖНО

После падения в воду кошку необходимо показать ветеринару, даже если вам кажется, что с ней все в порядке.

**1** Возьмите кошку за задние лапы и поддержите головой вниз, чтобы вылить воду из легких.



**2** Положите кошку на бок.

**3** Проверьте, дышит ли она и бьется ли сердце.


**4** Голову кошки расположите ниже туловища.



**5** Посмотрите, нет ли во рту инородных предметов.

**6** Вытяните язык наружу и удалите все, что мешает дышать.

**7** Если кошка все еще не дышит, следуйте инструкциям на с. 124 (реанимация при остановке дыхания).



**8** Если кошка в сознании, заверните ее в полотенце и покажите ветеринару.

# УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Если кошку ударило током, отключите от сети источник тока или оттолкните животное сухим неметаллическим предметом, например из дерева или резины.

Прежде чем подойти к кошке, которую ударило током, убедитесь, что это безопасно для вас. Кошек, особенно молодых, часто бьет током, потому что они жуют электрические провода. Последствия удара зависят от силы тока, напряжения и продолжительности контакта. Еще несколько дней после удара последствия могут не проявляться.

## ВАЖНО


Если кошку ударило током высокого напряжения, например она попала в линию электропередачи, позвоните в службу спасения.

**Ниже:** позаботьтесь о том, чтобы у кошки не было доступа к источнику тока; если у вас в доме есть болтающиеся провода, спрячьте или закрепите их, чтобы уберечь питомца.



## ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Если кошка перегрызла провод, она могла обжечь рот и язык. Это очень серьезно, и нужно немедленно отвезти ее в ветеринарную клинику: у кошки могут случиться шок и остановка сердца.
- Если кошка перестала дышать, начните реанимацию (см. с. 124).
- Если вы не уверены, был ли удар током, посмотрите, есть ли у кошки упомянутые ниже признаки.




**Выше и ниже:** если вам кажется, что кошку могло ударить током, ищите признаки ожогов; у кошки также могут наблюдаться судороги, обморок, слюнотечение и затрудненное дыхание.

### ВАЖНО

Если вы наблюдаете какие-то из перечисленных признаков, отвезите кошку к ветеринару.

**+** РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ с. 124



# ЛИХОРАДКА

Плохое самочувствие, вялость и сниженный аппетит могут быть признаками лихорадки.

Обычно высокую температуру у кошки можно определить, потрогав ее туловище. Можно взять ушной термометр, но они не очень точные. Если кошка кажется горячей или у нее жар более суток, незамедлительно отвезите ее в ветеринарную клинику.



Если у кошки слегка повышена температура, внимательно и осторожно осмотрите ее на наличие травм, абсцессов, отеков или опухших лимфатических узлов.

## ЕСЛИ У КОШКИ ТРАВМА

Если вы обнаружили у кошки перелом, опухоль, инфицированную рану, абсцесс или другое серьезное поражение, незамедлительно отвезите ее к ветеринару.

Если вы нащупали опухшие лимфатические узлы под челюстью, рядом с плечами, в паховой области или на задней части лап, также следует отвезти кошку в ветеринарную клинику.

**Ниже:** если вам кажется, что кошка нездорова, проверьте, не опухли ли лимфатические узлы; это может быть признаком лихорадки.



## ЕСЛИ У КОШКИ НЕТ ПРИЗНАКОВ ТРАВМЫ

Если вы не замечаете у кошки подобных признаков и небольшая температура держится менее суток, можно наблюдать за лихорадкой дома.

**1** Постарайтесь снизить температуру тела кошки, поместив ее в прохладную, темную комнату, желательно с плиткой на полу.

**2** Поставьте рядом пресную воду и еду.

**3** Если кошке трудно пить, наберите воду в шприц (без иглы) и медленно введите жидкость в рот кошке.

**4** По возможности поставьте рядом с кошкой вентилятор.

**5** Намочите кошке шерсть, аккуратно полив ее прохладной (не холодной) водой или приложив мокрую ткань.




**Выше:** если у кошки высокая температура, но очевидной проблемы нет, попробуйте снизить температуру, поместив кошку в прохладную, темную комнату.

**Слева и ниже:** ушной термометр менее точен, но при желании можете держать его в аптечке; запаситесь также шприцем, чтобы поить кошку при обезвоживании.



Ушной термометр



Шприц для воды


# РВОТА

Если кошку рвет, но в остальном она кажется здоровой, уберите миску с пищей и поставьте только свежую воду. Как только рвота прекратится, подождите два часа, а затем дайте питомцу чайную ложку еды. Если, съев ее, кошка не почувствует себя хуже в течение нескольких часов, дайте еще одну такую же порцию. Сутки кормите ее в таком режиме, а затем вернитесь к обычному.

Если кошку рвет больше суток и вы заметили признаки ухудшения здоровья, позвоните ветеринару и спросите его совета.

Свяжитесь с ветеринаром как можно скорее, если у кошки появились признаки, указанные ниже.

Десны поменяли цвет  
со светло-розового на бледный




24 ч

Признаки  
болезни  
проходят



## ВАЖНО

Если у кошки одновременно рвота и диарея, обратитесь в ветеринарную клинику.




Кошка теряет жидкость  
со рвотой, или в ее рвоте  
есть что-то необычное,  
например кровь

**Выше:** перед рвотой кошка издает характерные звуки или корчится; кроме того, у нее усиливается слюноотделение, сокращаются мышцы живота, и она многократно сглатывает.

# ДИАРЕЯ

Если у кошки диарея, но нет рвоты, она может поправиться самостоятельно. Обеспечьте ее большим количеством пресной воды и, если возможно, заставьте пить. Пока у кошки диарея, давайте ей простую пищу — курицу или белую рыбу.


Если ваша кошка молодая или, наоборот, пожилая (с сопутствующими заболеваниями) и диарея у нее продолжается более суток (также возможны и другие изменения состояния), необходимо отвезти животное в ветеринарную клинику. Если в стуле кровь, он темный, водянистый или кошка не контролирует его, также стоит обратиться к врачу.



Белая рыба



**Ниже и справа:** когда диарея прекратится, постарайтесь давать кошке больше воды, а пищу предлагайте небольшими порциями.



Вареная курица



# СУДОРОГИ

Если у кошки судорожный приступ, не забывайте, что без сознания она не чувствует боли. Будьте осторожны, чтобы не получить травму: мышцы лап и челюсти могут непроизвольно сокращаться во время приступа.

Если приступ длится более пяти минут или в течение суток случается более одного раза, покажите кошку ветеринару. Не забывайте, что во время приступа кошка может быть дезориентирована, вести себя странно и агрессивно. Если у кошки нет заболевания, при котором возможны судороги, причину может определить только ветеринар.


**Ниже:** вам, вероятно, захочется погладить и успокоить кошку, но это может продлить приступ; при необходимости переместите ее в безопасное место и наблюдайте за ней.

## КАК ПРОИСХОДИТ СУДОРОЖНЫЙ ПРИСТУП

- Резкое снижение кровяного давления.
- Неконтролируемая дрожь конечностей.
- Подергивание мышц морды.
- Слюноотделение.
- Потеря сознания.
- Неконтролируемые мочеиспускание и дефекация.


### ВАЖНО

Если вы наблюдаете какие-либо из вышеперечисленных признаков, отвезите кошку к ветеринару.




## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У КОШКИ ПРИСТУП СУДОРОГ

Если у кошки начались судороги, выполните следующие действия:



**1** Зафиксируйте время начала приступа и его продолжительность.



**2** Не берите на руки и не гладьте кошку: это может увеличить продолжительность приступа.

**3** Следите, чтобы кошка не поранилась: устройте ее на полу подальше от острых или горячих предметов, электроприборов и воды. Если нужно переложить кошку в безопасное место, сначала заверните ее в полотенце.



**4** Затемните комнату и сведите к минимуму шум.



Продолжительность приступа

**Справа:** обычно приступ длится 1–3 минуты, а восстановление может занять от нескольких секунд до нескольких часов.

# ПАРАЛИЧ


Утрата подвижности какой-либо части тела кошки может означать паралич. Позвоните в ветеринарную клинику и договоритесь о срочном приеме.

Паралич у кошек может быть частичным, то есть проявляться как неспособность шевелить одной конечностью, или всего тела. Если кошка не может пошевелить какой-то частью тела, что-то мешает прохождению нервных сигналов в мозг. Все формы паралича очень серьезны и должны восприниматься как чрезвычайная ситуация.

**Справа:** если кошку парализовало, за ней необходимо ухаживать особым образом, помогать ей во всем, включая уход за собой.



## ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПАРАЛИЧ?



Паралич может возникнуть неожиданно и быть результатом другого заболевания.

Распространенные причины:

- укус клеща;
- тромб;
- нарушение мозгового кровообращения;
- вирусная инфекция;
- криптококкоз;
- повреждение нервов;
- травма;
- опухоль;
- ботулизм;
- токсоплазмозная паразитарная инфекция;
- воспаление спинного мозга или центральной нервной системы.

**Слева:** некоторые клещи вырабатывают токсин, вызывающий паралич у кошек; если такой клещ укусил вашу кошку, отвезите ее в ветеринарную клинику для оказания неотложной помощи.

## ТРАНСПОРТИРОВКА ПАРАЛИЗОВАННОЙ КОШКИ

- Положите кошку на твердую плоскую поверхность, например большую книгу в твердом переплете, доску или кусок толстого картона, стараясь не менять положение парализованной части тела.
- Если возможно, попросите кого-нибудь поехать с вами, чтобы держать кошку во время поездки.
- Если помочь некому, положите кошку на доску в переноску или, если нет переноски, в пластиковую или картонную коробку.



Чтобы перенести кошку, сделайте носилки

### 🇨🇷 КАК СДЕЛАТЬ НОСИЛКИ с. 74

## КАК ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ ПАРАЛИЗОВАННОЙ КОШКЕ

В зависимости от тяжести травмы можно поменять условия жизни кошки:

- поставить лоток с низкими бортиками;
- поставить миску с едой на возвышение;
- приобрести ортопедическую лежанку;
- сделать пандус к лежанке кошки;
- установить ограждение на лестнице, чтобы обезопасить свою кошку;
- регулярно вычесывать кошку;
- регулярно купать кошку;
- помочь кошке пользоваться лотком.

Если кошка перенесла травму или нарушение мозгового кровообращения, можно сделать ей мобильное устройство или инвалидную коляску; для этого обратитесь к своему ветеринару. Он поможет принять правильное решение, основываясь на ситуации конкретно с вашей кошкой.



**Выше:** чтобы у кошки не слишком упало качество жизни после паралича, попробуйте разные способы облегчить ей жизнь.

# ОТРАВЛЕНИЕ

Многие из наших продуктов питания ядовиты для кошек. Чтобы случайно не отравить кошку, не кормите ее остатками своей пищи. Кошачий корм нравится кошкам и питателен для них. Если вам хочется порадовать питомца, купите лакомства для кошек в зоомагазине.

Держите лекарства, чистящие средства и любую химию в недоступном для кошек месте. Если кошка научилась залезать в шкафы, установите специальные защелки. Не травите ядом вредителей внутри или вокруг дома, где гуляет кошка.

**Ниже:** большинство случаев отравления можно предотвратить; держите токсичные для кошек вещества в шкафу, куда не сможет залезть ваш питомец.



## ЯДОВИТЫЕ ДЛЯ КОШЕК ПРОДУКТЫ

Храните токсичные для кошек продукты, лекарства, растения и химию в шкафах или другом недоступном для кошек месте. Ядовитые и потенциально опасные продукты включают:



Лук и чеснок



Сырые яйца и мясо



Молочные продукты  
(включая молоко)



Виноград и изюм



Алкоголь



Сырое тесто  
(выделяет продукты брожения в желудке кошки)



Ядовитые или галлюциногенные грибы



Шоколад и кофеин




Орехи макадамия



Помидоры, особенно незрелые



Сахар и подсластители



Фруктовые косточки и семена (могут закупорить кишечник)

## ЯДОВИТЫЕ ДОМАШНИЕ РАСТЕНИЯ

Убедитесь, что у вас нет растений, ядовитых для кошек. Таких много, к наиболее распространенным относятся:



Лилия



Рододендрон



Азалия



Тюльпан



Нарцисс



## ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ У КОШЕК

Признаки отравления зависят от яда и того, как он попал в организм кошки (проглотила она его, вдохнула или контактировала с ним напрямую).

Наиболее распространенными признаками отравления являются:

- рвота;
- диарея;
- слабость;
- бледные десны;
- затрудненное дыхание;
- слюноотделение;
- кровь в рвоте, стуле или слюне;
- чрезмерная жажда;
- потеря аппетита.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Если у вас есть кошка, не нужно приносить в дом лилии. Растения из рода *Lilium* и *Nemeroscallis* очень токсичны для кошек и могут привести к смерти. Ядовиты все части растения. Пыльца может пристать к шерсти, когда кошка будет проходить мимо букета, и затем животное слизет ее, что приведет к острой почечной недостаточности.

Если у вас дома есть антифриз, храните его в надежном месте подальше от питомца. Кошкам нравится запах антифриза, но если животное его проглотит, то это приведет к смерти от тяжелой болезни почек. Всего одна чайная ложка антифриза является смертельной дозой.

Чтобы кошка не проглотила антифриз, тщательно вытирайте его, если прольете, даже каплю, и храните контейнеры закрытыми в шкафу или кладовке.

### ВАЖНО

Не вызывайте рвоту у кошки, если только это не рекомендация вашего ветеринарного врача.

### ДЕЙСТВУЙТЕ!

Если вы считаете, что кошка могла отравиться, незамедлительно отвезите ее в ветеринарную клинику. При отравлении важно не упустить время.

Если кошка проглотила пыльцу лилии, антифриз, средство от сорняков или любое из перечисленных ранее веществ, как можно скорее доставьте ее к ветеринару. Кошка также может отравиться лекарством для местного лечения блох (при передозировке), крысиным ядом и лекарствами человека. Если кошка что-то съела и вы не знаете, опасно это вещество или нет, позвоните своему ветеринару или в ветклинику.


**Справа:** если у кошки появились признаки отравления, как можно скорее отвезите ее в ветеринарную клинику; чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов ее спасти.



# БЕРЕМЕННОСТЬ

Если кошка не стерилизована и вы думаете, что она может быть беременна, покажите ее ветеринару, чтобы он определил наверняка. К тому времени, когда вы заметите признаки беременности, кошка может быть в положении уже несколько недель.

Беременность у кошек длится 60–67 дней. Поскольку трудно точно определить, когда начнутся роды, владельцы обычно готовятся к тому, что кошка будет рожать дома. Если вы переживаете о том, как все пройдет, сходите на консультацию к ветеринару, он ответит на ваши вопросы. Кошкам нужна поддержка на протяжении всего срока беременности, а также особый уход за ней и котятками во время родов и сразу после них.



**Выше и ниже:** отвезите кошку в ветеринарную клинику, если вам кажется, что она беременна; ветеринар проконсультирует вас, ответит на вопросы и поможет подготовиться к процессу родов.



ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОДДЕРЖКА  
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА




## ПОДГОТОВКА К РОДАМ

В течение последних недель беременности кошка начинает искать место для родов. Можно поставить ей в укромном месте картонную коробку, набитую газетами и старыми (но чистыми) одеялами или полотенцами. Не выпускайте кошку из дома в течение последней недели перед предполагаемыми родами, чтобы наблюдать за ней и принять меры, если возникнут какие-то осложнения.



**Выше:** чтобы подготовиться к родам кошки дома, выстелите коробку или ящик чистыми полотенцами или одеялом, сделав таким образом уютный домик; поставьте коробку в укромное место. Здесь кошка должна чувствовать себя в безопасности, ей должно быть удобно.



## РОДЫ

Непосредственно перед родами кошки ведут себя беспокойно, часто кричат, тяжело дышат и вылизывают область гениталий и соски. За несколько часов до родов кошка может перестать есть. Процесс родов проходит в три этапа.

### Первый этап

Если все идет хорошо, то первая стадия длится до 36 часов, особенно если это первые роды кошки. Шейка матки и влагалище расслабляются, и матка начинает сокращаться. Кошка не будет тужиться на этом этапе, но по брюшной стенке будет видно, как движется котенок. Кошка будет регулярно залезать в коробку и выходить из нее. Внимательно следите за кошкой, успокаивайте ее, обеспечивая комфорт и поддержку.



### Второй этап

На втором этапе матка сокращается чаще и сильнее. Первый котенок доходит до таза, и оболочка околоплодного мешка на короткое время видна в вульве. «Пузырь с жидкостью» лопаются, и жидкость понемногу выходит. Кошка, скорее всего, начнет слизывать содержимое. Второй слой пузыря, где находится котенок, пройдет через таз. Сначала должна появиться голова, а затем и туловище котенка. Этот этап занимает от 5 до 30 минут.

### ВАЖНО


Если на каком-либо этапе родов вам покажется, что что-то идет не так, незамедлительно позвоните в ветеринарную клинику и спросите совета.

Когда рождается котенок, кошка прокусывает оболочку и прочищает ему рот и нос

Амниотический (плодный) пузырь лопается, высвобождая плодную жидкость

Благополучно рожденный котенок остается со своей матерью в тепле и комфорте

РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ КОТЕНОК



БЛАГОПОЛУЧНОЕ РОЖДЕНИЕ





### Третий этап

Между вторым и третьим этапами перерыва нет. На третьем этапе оболочки проходят через таз вместе с последом, представляющим собой темную массу. Второй и третий этапы повторяются с рождением каждого котенка в помете. Не пугайтесь, если послед не выходит сразу после каждого котенка; иногда второй котенок прерывает эту последовательность — оба последа выйдут вместе, как только этот котенок родится. Между рождением каждого котенка может пройти от 10 минут до часа. У кошек рождается от 1 до 12 котят (чаще всего их 4).

**Ниже:** чаще роды у кошек проходят естественным путем и без проблем, поэтому кошкам, как правило, безопасно рожать дома при условии, что вы рядом и следите за процессом.

### ВАЖНО

Иногда кошка рождает одного или нескольких котят, а перед рождением следующих делает перерыв до 36 часов. Это называется прерывистыми родами, и во время перерыва можно дать кошке еды и воды.



Кошка будет прокусывать оболочки по мере рождения каждого котенка, открывая первым делом область носа и рта, откусит пуповину и проглотит послед. Это естественный процесс, и в большинстве случаев кошка сама с ним справится без вмешательства человека.

При благополучных родах перерыв между котятами может достигать часа

МНОГОПЛОДНЫЕ РОДЫ



Внимательно наблюдайте за кошкой и котятами, пока все котята не родятся, но старайтесь не вмешиваться без необходимости

РОДЫ ЗАКОНЧЕНЫ





## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ИДЕТ НЕ ТАК?

Большинство кошек рожают самостоятельно и без проблем, но важно, чтобы вы были рядом, наблюдали за процессом и знали, чего ожидать в случае, если возникнут осложнения. Как упоминалось выше, у некоторых кошек роды приостанавливаются на срок до 36 часов, а затем продолжают снова. В этих случаях кошка-мать расслаблена, может поесть, попить, кормит котят. Если задержка длительная и кошке явно нехорошо, могут возникнуть осложнения.

Схватки во время нормальных родов бывают сильными, но вы будете видеть прогресс родов и то, что он не причиняет кошке боли. Если кошка тужится, но прогресса нет, возможно, есть какое-то препятствие. Ваша кошка может тяжело дышать, мяукать, метаться или выглядеть утомленной. В этом случае можно прощупать снаружи область промежности под хвостом, чтобы определить, есть ли котенок

**Выше:** если кошка не смогла очистить дыхательные пути котенка, возьмите чистую ткань и аккуратно удалите оболочку со рта и носа.


в области таза. Если вы не чувствуете ничего вокруг вульвы, позвоните ветеринару и спросите совета.

Если вы видите часть котенка у вульвы, он должен скорее выйти наружу, чтобы выжить. Если нет возможности немедленно вызвать врача, лучше принять меры.


Если кошка перестала тужиться, котенок виден из вульвы и лежит в правильном положении (головой вперед), можно очистить дыхательные пути котенка от оболочки. Как только покажутся нос и рот, осторожно вытащите котенка, потянув за него, сохраняя при этом угол наклона вниз, чтобы соответствовать углу родового канала.

## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОТЕНОК ВЫХОДИТ ЛАПАМИ ВПЕРЕД

Если вместо головы из вульвы высовываются хвост и лапы, действовать нужно безотлагательно.




**1** Котенок будет скользким, поэтому, чтобы его ухватить, возьмите бумажное полотенце.



**2** Аккуратно вытащите котенка, потянув с небольшим наклоном вниз и осторожно манипулируя, меняя наклон сначала в одну сторону, потом в другую.



**3** Положите котенка рядом с головой матери, чтобы она могла слизать оболочку. Дайте ей примерно минуту, прежде чем вмешаться.



**4** При необходимости аккуратно очистите нос и рот котенка от оболочки с помощью полотенца и наклоните его голову вниз, чтобы удалить жидкость и чтобы он смог дышать.

# УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ КОТЯТАМИ

Новорожденные котята зависят от матери-кошки, она их греет и кормит. Как правило, на этом этапе вам нужно будет взять на себя вспомогательную роль, присматривая за матерью и котятами и обеспечивая их всем необходимым.

Первые четыре недели котята получают все необходимое питание от матери. Очень важно, чтобы они питались материнским молоком каждые 2–3 часа, потому что молоко содержит антитела, защищающие котят от болезней. Если вы считаете, что котенок не получает достаточного питания от матери, обратитесь к ветеринару.

## ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если кошка и котята выглядят здоровыми, отвезите их всех в ветеринарную клинику на обследование в течение недели после рождения. Перевозите кошку и котят вместе, чтобы котята были в тепле и меньше тревожились.

Кошка должна лежать на боку, тогда котята будут сосать молоко. Первые недели они едят по многу часов каждый день и полностью зависят от молока. Убедитесь, что в этот период у кошки много еды, воды и ей удобно. К четвертой неделе котята должны начать копировать поведение кошки — ходить в лоток. Примерно в то же время они начинают есть твердую пищу.

**Ниже:** лучше всего первые пару недель не слишком беспокоить кошку и котят; если нет очевидных проблем, наблюдайте за ними, следите за их здоровьем, не вмешиваясь физически.



## ПОСЛЕРОДОВОЙ УХОД ЗА КОШКОЙ И НОВОРОЖДЕННЫМИ КОТЯТАМИ

Для здоровья новорожденных котят важна правильная среда. Необходимо регулярно проверять, как они себя чувствуют, но не вмешиваться без необходимости.

- 1 Коробка должна быть достаточно большой, чтобы в ней было комфортно и кошке, и котятам. Выстелите коробку чистыми полотенцами и регулярно их меняйте.
- 2 Поставьте коробку в укромное место, где кошку не потревожат другие члены семьи и домашние животные. Держите дверь в комнату закрытой и постарайтесь не шуметь рядом.
- 3 В комнате должно быть тепло — от 20 до 23 °С. Холод смертельно опасен для котят.
- 4 Старайтесь без необходимости не вмешиваться в жизнь кошки. Кошка после родов будет слабой и, как и котята, будет сильно нервничать, если вы станете брать детенышей в руки и подолгу держать. Подходите к кошке медленно и осторожно, в зависимости от реакции корректируйте свои действия.
- 5 Наблюдайте за кошкой и котятами, следите, чтобы все котята находили соски и ели молоко каждые 2–3 часа.
- 6 В течение недели после родов отвезите кошку вместе с котятами в ветеринарную клинику на первое обследование.

## ПОСЛЕРОДОВОЙ УХОД ЗА КОШКОЙ

Ухаживая за котятами, не забывайте о кошке. Нечасто, но бывает, что у кошки после родов возникают проблемы со здоровьем. К ним относятся:

- **Мастит.** Если вы заметили, что у кошки отекла, воспалилась или поменяла цвет область вокруг молочных желез или котята не набирают вес с ожидаемой скоростью, как можно скорее покажите их ветеринару.
- **Гипокальциемия.** Если вы заметили, что кошка стала беспокойной, скованной, слабой, раздражительной, сверхчувствительной к прикосновениям или звукам, что она дрожит, это может означать недостаток кальция в крови. Отвезите ее к ветеринару как можно скорее.
- **Эндометрит.** Если вы заметили, что из влагалища кошки сочится гной или он на шерсти вокруг, это может означать воспаление слизистой матки. Отвезите кошку в ветеринарную клинику как можно скорее, если заметили гной, а также вялость, потерю аппетита, слабость, рвоту, диарею, избыточное потребление воды и подавленное состояние.

### ВАЖНО

Скорее всего, у кошки с котятами будет все хорошо без вашего участия, но очень важно понимать, какие проблемы могут возникнуть.

# РЕАНИМАЦИЯ НОВО- РОЖДЕННОГО КОТЕНКА

Если вам нужно привести в сознание недышащего котенка, сначала очистите ему нос и рот от оболочки и наклоните голову вниз, чтобы убрать жидкость.

Если пуповина не порвалась, разорвите ее, зажав между пальцами (это имитирует то, как ее перекусывает кошка). Держите пуповину за конец, идущий от котенка, чтобы случайно не потянуть за него.

**Справа:** если вы заранее изучите, как помочь новорожденному котенку, вы сможете в прямом смысле слова оживить его.



## ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ

### ВАЖНО

Если котенок не начал дышать после того, как вы выполнили рекомендации справа, обратитесь к ветеринару.




- Если дыхательные пути открыты, ветеринар может посоветовать сделать искусственное дыхание.
- Для этого нужно очень осторожно подуть в крошечные легкие котенка через рот и нос.
- Можно использовать соломинку, чтобы не переборщить.
- Пытаться привести в сознание котенка можно примерно полчаса с момента его рождения; если вы живете рядом с клиникой неотложной ветеринарной помощи, позвоните туда и спросите, следует ли вам принести им котенка.


## КАК ПРИВЕСТИ В СОЗНАНИЕ КОТЕНКА

Если котенок по-прежнему не дышит, возможно, нужно удалить жидкость из дыхательных путей.

**1** Положите котенка спиной на ладонь, поддерживая шею между указательным и средним пальцами.



**2** Аккуратно обхватите котенка рукой так, чтобы ладонь была обращена к полу, вытяните руку и очень осторожно взмахните ею. Это поможет удалить жидкость и стимулировать дыхание. Будьте очень аккуратны, чтобы не навредить котенку\*.



**3** Затем удалите все лишнее вокруг носа и рта, а также нежно погладьте живот котенка. Если котенок начал дышать, аккуратно оботрите его полотенцем.

### ВАЖНО

Очень важно, чтобы новорожденные котята находились в тепле. Кошка обычно греет их, находясь рядом, но если она этого не делает, можно положить котятам бутылку с теплой (не горячей) водой, хорошенько завернутую в одеяло, чтобы они не замерзли.

\* Неосторожные действия могут привести к сотрясению мозга. *Прим. науч. ред.*

# КАК СДЕЛАТЬ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВОРОТНИК

Ветеринарный (елизаветинский) воротник представляет собой простое приспособление, используемое для того, чтобы кошка не вылизывала себе раны.


Ветеринарный воротник — испытанный способ не дать кошке добраться до раны, однако нельзя сказать, что кошкам он нравится. Ваш питомец, скорее всего, сделает все возможное, чтобы высвободиться из него, поэтому будьте готовы к тому, что понадобится срочная замена.

**Ниже:** примеряя кошке ветеринарный воротник, убедитесь, что он надежно закреплен и комфортен: под воротник должны проходить два пальца.




## КАК БЫСТРО СДЕЛАТЬ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВОРОТНИК


В экстренной ситуации, когда вам нужен такой воротник, но у вас его нет, можно сделать его самостоятельно.




**1** Чтобы воротник был нужной высоты, измерьте расстояние от шеи кошки до кончика носа и прибавьте 2,5 см.




**2** Чтобы отверстие для шеи получилось нужного размера, измерьте ее обхват и прибавьте 1,3 см.



**3** Выставьте циркуль на необходимую высоту, вычисленную в пункте 1, нарисуйте круг на картоне и вырежьте его.



**4** Вырежьте небольшой сектор круга.



**5** Выставьте циркуль на четверть величины, вычисленной в пункте 2, нарисуйте круг в середине картонного круга и вырежьте его.

**6** Сложите большой картонный круг в конус и сделайте несколько отверстий примерно в 1,3 см от краев, где соединяются обе стороны. Проделайте отверстия на обеих сторонах и проденьте ленту через отверстия, чтобы скрепить две стороны вместе; завяжите ленту, чтобы закрепить ошейник на шее кошки.



# КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕНОСКУ


Если у вас под рукой нет кошачьей переноски, в экстренной ситуации можно использовать другие предметы, чтобы доставить кошку к ветеринару.

Всегда лучше иметь специальную переноску, чтобы отнести кошку в клинику, но в чрезвычайной ситуации можно импровизировать.

**Ниже:** если для транспортировки кошки вы используете коробку, убедитесь, что она хорошо проветривается и достаточно безопасна, чтобы кошка не смогла вырваться оттуда или провалиться сквозь дно.


## ВАЖНО

Если у вас есть кошка, у вас в хозяйстве должна быть и кошачья переноска. Она необходима в чрезвычайной ситуации, но, даже если кошка здорова, вам придется носить ее в ветеринарную клинику на осмотр. Нельзя переносить кошку в клинику на руках. Информацию о переносках вы найдете на с. 75.




## ТИПЫ ПЕРЕНОСОК

• Что бы вы ни использовали в качестве переноски, убедитесь, что это надежно (кошка, скорее всего, попытается вырваться) и хорошо вентилируется.



- Большая картонная коробка с дырками по бокам. Убедитесь, что коробка прочная и выдержит вес кошки; основание следует надежно закрепить скотчем. Если вы несете кошку в картонной коробке, обязательно поддерживайте дно одной рукой.
- Большой пластиковый контейнер с отверстиями в крышке.
- Хорошо проветриваемая спортивная сумка с твердым дном. Спортивные сумки обычно изготавливаются из дышащего материала, такого как нейлон, в котором есть сетка, обеспечивающая поступление воздуха. Не берите непромокаемую сумку, если не хотите вырезать по бокам отверстия для вентиляции.

Независимо от того, будет это коробка или сумка, переноска должна быть достаточно большой, чтобы кошка могла лечь, и иметь прочную основу для защиты и комфорта животного. Если вы перевозите кошку в автомобиле, пристегните переноску ремнем безопасности. Регулярно проверяйте кошку, чтобы убедиться, что ей есть чем дышать.



**Выше:** независимо от того, используете вы вентилируемую коробку или сумку, сделайте переноску более удобной для кошки, которая, скорее всего, будет испытывать стресс; положите туда кошачью подстилку или один из ваших старых джемперов.

## ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

- В случае крайней необходимости, когда у вас нет ничего другого, используйте дышащую хлопчатобумажную наволочку, завязав ее сверху.
- Надежно уложите наволочку с кошкой в корзину или контейнер без крышки, чтобы кошка не вырвалась и не поранилась в наволочке.

## ВАЖНО

Постелите в переноску полотенца на случай, если ваша кошка помочится. Если вы несете ее в картонной коробке или промокаемой сумке, поставьте переноску в пакет. Не кладите его на дно, это ограничит поток воздуха.

# ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

## КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ/КАСТРАЦИИ?

Стерилизация и кастрация предполагают хирургическое вмешательство, поэтому существует некоторый риск последствий анестезии. Тем не менее у этих процедур есть много преимуществ, и они обычно перевешивают риски. В целом, стерилизация или кастрация снизят риск развития рака у кошки в будущем. Кроме того, будет ниже риск развития опасной инфекции матки, а также риски, связанные с беременностью и родами. Эти процедуры не сказываются на характере кошки, при этом они могут устранить нежелательное поведение, такое как агрессия и склонность убегать. Приюты для животных переполнены, поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас были котята, рекомендуется стерилизовать кошку или кастрировать кота. Если у кошки диабет или эпилепсия, также следует провести операцию, чтобы уменьшить гормональные изменения, препятствующие воздействию лекарств.

## В КАКОМ ВОЗРАСТЕ НУЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ КОШКУ/ КАСТРИРОВАТЬ КОТА?

Идея о том, что необходимо дать кошке возможность окотиться один раз перед стерилизацией, является мифом; это необязательно и не принесет никакой пользы питомцу. Независимо от пола кошку можно стерилизовать или кастрировать в возрасте примерно четырех месяцев.



Кошек можно стерилизовать или кастрировать с четырех месяцев\*

## КАК ЧАСТО КОШКУ НУЖНО ПРИВИВАТЬ?

Котят впервые прививают от распространенных заболеваний примерно в 9 недель, а затем еще раз в 12 недель. После первых прививок нужно приносить кошку в ветеринарную клинику на вакцинацию раз в год. Если у кошки нет прививок вообще или не было более 15 месяцев, обсудите с ветеринаром, какие прививки ей нужны. Первичные прививки защитят питомца от инфекционного энтерита кошек, герпесвируса кошек, калицивируса кошек, хламидиоза кошек и вируса лейкоза кошек.

\* Российские ветеринарные врачи рекомендуют проводить эти операции начиная с семи-восьми месяцев. *Прим. науч. ред.*



## НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ КОШКЕ КОГТИ?

Если нет очевидной медицинской причины, когти кошкам удалять не нужно. Царапаться для кошек естественно, так они маркируют свою территорию, точат когти для лазания и защиты. Процесс удаления когтей бывает очень болезненным и может вызывать другие осложнения, включая боль в спине и изменения в поведении; кошка может начать кусаться, стать агрессивной и ходить в туалет в неподобающие места. Чтобы кошка не царапала мебель, повесьте когтеточки и поставьте картонные коробки; хвалите кошку, когда она ими пользуется. Если царапание становится серьезной проблемой, можно периодически подрезать когти либо в ветеринарной клинике, либо, если это удобно, самостоятельно (см. с. 24).

**Периодически подрезайте кошке кончики когтей**

**Обеспечьте кошку местом, где она будет точить когти: когтеточкой или коробкой**

## НУЖНО ЛИ ВЫПУСКАТЬ КОШКУ НА УЛИЦУ?

Вопрос о том, разрешать ли кошкам свободно гулять на улице, много обсуждается. С одной стороны, кошкам полезно гулять, это естественно для них, так они исследуют мир, лазают по деревьям, общаются с другими кошками и охотятся. Гуляя, они поддерживают хорошую физическую форму, и у них больше стимулов для работы мозга. С другой стороны, за пределами дома больше опасностей — оживленные дороги и соплеменники, с которыми приходится драться. Уличные кошки чаще болеют и цепляют паразитов; также они наносят вред дикой природе, особенно птицам (хотя в этом случае помогает ошейник с колокольчиком). Если вы не уверены, выпускать ли кошку, обсудите ситуацию с ветеринаром.

**Удаление когтей может вызывать проблемы со здоровьем; делать это следует лишь в случае очевидных медицинских показаний. В некоторых странах такая практика незаконна**





## МОЯ КОШКА НЕНАВИДИТ ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Постарайтесь приучить кошку к переноске. Для этого оставляйте переноску открытой на какое-то время. Нужно, чтобы кошка стала воспринимать переноску как безопасное и приятное место. Оставьте там одеяло и лакомства; играйте с кошкой в переноске, чтобы она привыкла. Для снижения стресса во время поездки можно побрызгать внутри спреем с кошачьими феромонами. Постелите на дно одеяло или полотенце, чтобы кошке было удобно. Можно положить свой поношенный свитер, чтобы внутри был знакомый запах. Найдите ветеринарную клинику только для кошек либо такую, где есть отдельная, специально разработанная зона ожидания, или узнайте, есть ли в вашем городе мобильная ветеринарная служба, чтобы врач приехал на дом.

## КАК ЧАСТО НУЖНО ВОЗИТЬ КОШКУ В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ?

Нужно несколько раз посетить ветеринарную клинику с котенком, чтобы ему сделали первичные прививки. После этого здоровая взрослая кошка должна раз в год проходить обследование. Если у кошки есть постоянные проблемы со здоровьем, ее придется чаще показывать ветеринару.


**В первый год жизни котят нужно регулярно возить в клинику на вакцинацию, а также для стерилизации или кастрации**



**Взрослую кошку нужно возить на осмотр и вакцинацию раз в год**

## НУЖНО ЛИ ЧИПИРОВАТЬ КОШКУ?

Если кошка сбежит или заблудится, микрочип увеличит шансы ее найти. Микрочип — это электронный чип размером с рисовое зернышко, содержащий контактную информацию о владельце. Он вводится кошке под кожу и остается там на всю жизнь. Если кошку найдут, местная ветеринарная клиника или организация по спасению животных отсканирует микрочип и получит ваши контактные данные. После того как животному сделают укол и введут чип, все, что вам нужно делать, — это обновлять свои данные (номер телефона, домашний адрес, контактные данные для экстренных служб).



## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НАШЕЛ БЕЗДОМНУЮ КОШКУ?

Если вы обнаружили раненую дикую или бродячую кошку, обратитесь в местную станцию борьбы с болезнями животных (СББЖ). Не пытайтесь взять на руки агрессивную или пугливую кошку. Возможно, лучше всего перевезти такую кошку, используя гуманную ловушку для животных. После этого переноску нужно тщательно продезинфицировать. Если вы обнаружили травмированную, но дружелюбно настроенную кошку, вероятно, у нее есть хозяин, но будьте осторожны, приближаясь к животному и взаимодействуя с ним (с. 70). Если вы в состоянии безопасно перевезти травмированную кошку в переноске в ветеринарную клинику или СББЖ, сделайте это. Там осмотрят кошку и помогут найти хозяина. Если у вас нет средств для транспортировки кошки, позвоните в местную СББЖ — вероятно, они смогут ее забрать.

## КАК НАЙТИ ХОЗЯИНА КОШКИ?

Чтобы узнать, есть ли у кошки хозяин, можно сделать следующее:

- Если у кошки есть ошейник, проверьте, имеются ли на нем контактные данные.
- Отвезите кошку в ветеринарную клинику, где ее просканируют на наличие чипа.
- Опросите жителей района, где вы нашли кошку.
- Разместите фотографию животного в социальных сетях и попросите местных поделиться ею.
- Распространите объявление с фотографией, описанием и вашими контактными данными по всему району.
- Проверьте местные газеты и группы в социальных сетях: может быть, эту кошку уже ищут.

## КОШКА ПОСТОЯННО ХОДИТ В ТУАЛЕТ МИМО ЛОТКА, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Есть много причин, по которым кошки не ходят в лоток. Если кошка пытается им пользоваться, но мочится или испражняется в непосредственной близости от него, возможно, он просто слишком мал. В этом случае кошка может сидеть на корточках в лотке, но просто не попадать в него, поэтому следует поставить лоток большей площади. Удобный лоток должен быть в полтора раза длиннее и в три раза шире кошки.


В идеале лоток должен стоять в тихом и спокойном месте, подальше от еды и места, где кошка спит. Если у вас больше одной кошки, у каждой должен быть свой лоток. Кошки не любят ходить в грязный лоток; необходимо каждый день чистить его и менять наполнитель по мере необходимости. Наполнитель нужно насыпать слоем в 5–7 см.

Если у вас большой лоток, но кошка ходит в туалет на самый край, возможно, ей не нравится наполнитель. Попробуйте поставить второй лоток с другим наполнителем и посмотрите, какой она выберет.

Если у кошки запор, она может попытаться забраться в лоток, но через некоторое время перестать тужиться и уйти. При этом она может сходить в туалет уже за пределами лотка. Если проблема в этом, нужно отвезти кошку к ветеринару.

Если у вас пожилая или стареющая кошка, может быть, стоит заменить лоток на другой, меньшей глубины и большей площади, чтобы кошке было легче входить и выходить из него.

Если ваша кошка регулярно посещает лоток, но не испражняется и не мочится или же ходит в туалет далеко от лотка, покажите кошку ветеринару и обсудите потенциальные причины: может быть, есть медицинская проблема.



Убедитесь, что лоток подходит вашей кошке по размеру

Найдите наполнитель, который понравится кошке

Ежедневно чистите лоток

## КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ КОШКА НЕ ЛИНЯЛА?

Линька — это естественный процесс, и невозможно помешать кошке менять шерсть. Однако можно уменьшить выпадение шерсти. Все кошки линяют, и интенсивность отличается в зависимости от рациона, общего состояния здоровья и смены сезонов. (В холодные месяцы кошки отращивают более густую шерсть и сбрасывают ее, когда становится теплее.) Лучший способ контролировать выпадение шерсти — регулярно вычесывать кошку, еженедельно или даже ежедневно, чтобы помочь ей избавляться от шерсти.

### ВАЖНО


Если вы видите, что кошка линяет сильнее, чем обычно, покажите ее ветеринару; чрезмерная линька может быть следствием болезни, например паразитов или проблем с питанием.



Начните вычесывать кошку с раннего возраста, чтобы она привыкла к этой процедуре

Кошка будет линять по мере смены времен года





4

•-----•  
**ПРИЛОЖЕНИЯ**

# КЛАССИФИКАТОР



## НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ТРАВМЫ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Ситуация	Страница	Ситуация	Страница
Абсцесс	129	Перевязка раны	77
Беременность: как определить	102	Порезы	141
Боль: признаки	112	Проблемы с мочеиспусканием	144
Боль: как облегчить	115	Пульс	60
Инфицированная рана	136	Рвота	152
Клещ: удаление	49	Температура: измерение	61
Когда обращаться к ветеринару	62	Травмы лап	142
Компресс	129	Травмы хвоста	141
Кровотечение	137	Укусы животных	132
Лекарства: как давать	90–97	Укусы насекомых	132
Неглубокая рана	76	Ушные капли	94
Ожог	130	Физраствор	80



# ТРАВМ И БОЛЕЗНЕЙ




## СЕРЬЕЗНЫЕ СИТУАЦИИ


Ситуация	Страница	Ситуация	Страница
Боль: признаки	112	Реанимация при остановке дыхания	124
Инфицированная рана	136	Реанимация при остановке сердца	125
Кровотечение	137	Смерть: признаки	123
Лихорадка	150	Судороги	154
Обморок	124	Температура: измерение	61
Ожог	130	Тепловой удар	128
Остановка дыхания	124	Травма головы	140
Отравление	158	Удар током	148
Паралич	156	Удушье	120
Перелом	126	Утопление	146
Пульс	60	Частота дыхания	59
Реанимация котенка	170	Шок	117

### ВАЖНО

Если на любом из этапов вам показалось, что с кошкой что-то не так, обратитесь за консультацией в ветеринарную клинику.



# ГЛОССАРИЙ



Рудиментарный палец

## Абсцесс

Опухшая область ткани, наполненная гноем.

## Бешенство

Вирусное заболевание млекопитающих, передающееся через жидкости организма.

## Ботулизм

Пищевое отравление, вызванное бактерией *Clostridium botulinum*, которая встречается в необработанном мясе и других продуктах питания.

## Вакцинация

Профилактика болезни при помощи стимуляции антител и выработки иммунитета.

## Ветеринарный воротник

Приспособление, которое надевают на шею кошке, чтобы она не могла вылизывать раны.

## Гипокальциемия

Дефицит кальция в крови.

## Заболевание нижних мочевыводящих путей у кошек

Болезнь, поражающая мочевой пузырь или мочеиспускательный канал кошки.

## Загривок

Область плотной кожи в районе затылка за ушами.

## Кастрация

Хирургическое удаление яичек у кота.

## Колотая рана

Травма, вызванная колющим предметом, например осколком кости.

## Кормушка-головоломка

Игрушка, одновременно являющаяся кормушкой и стимулятором развития мозга.

## Кошачий вой

Громкие вопли, которые издают кошки; являются признаком течки.

## Кошачий герпесвирус

Очень заразный вирус, вызывающий респираторные инфекции у кошек.

## Кошачий инфекционный энтерит

Высококонтагиозный вирус, вызывающий тяжелый гастроэнтерит у кошек.

## Кошачий хламидиоз

Высококонтагиозная болезнь, вызываемая бактерией *Chlamydomphila felis* и провоцирующая глазные инфекции у кошек.

## Криптококкоз

Инфекция, вызываемая несколькими видами дрожжевых грибов.

## Кусаная рана

Рана, нанесенная зубами другого животного.

## Лимфатический узел

Структура в форме фасолины, фильтрующая лимфатическую жидкость, важный компонент иммунной системы.

## Мастит

Инфекция молочных желез.



**Подрезая когти, не заденьте кровеносный сосуд внутри ногтевой пластины**

### Микрочип

Небольшой носитель информации, который вводят под кожу животному.

### Ногтевая пластина

Чувствительная часть когтя кошки с проходящим через нее кровеносным сосудом и нервными окончаниями.

### Облигатный хищник

Животное, которому требуется много мяса в рационе.

### Остановка сердца

Неспособность сердца нормально качать кровь из-за прерывания кровотока.

### Поражение

Область пострадавшей ткани.

### Расширенные зрачки

Зрачки, ставшие больше по размеру, чем обычно.

### Реанимация

Процесс приведения кошки из обморочного/предсмертного состояния в сознание.

### Рудиментарный палец

Палец на передних конечностях, находящийся выше остальных.

### Стерилизация

Хирургическое удаление яичников и матки у кошки.

### Стресс

Эмоциональная боль или шок после несчастного случая или другого неприятного переживания.

### Течка

Период полового цикла, когда кошка готова к спариванию.

### Физраствор

Смесь соли и воды для промывания ран.

### Токсоплазмоз

Заболевание, вызываемое паразитом *Toxoplasma gondii*.

### Хронический язвенный парадентальный стоматит (CUPS)

Заболевание полости рта, при котором на деснах и слизистой рта образуются болезненные язвы.

### Частота дыхания

Количество вдохов, которые кошка делает в минуту.

### Шок

Критическое состояние, вызванное недостаточным кровоснабжением.

### Эндометрит

Воспаление слизистой оболочки матки.

### Якобсонов орган

Орган в верхней части ротовой полости кошки, необходимый для обоняния.



Реанимация

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

## А

абсцессы 23, 129, 134, 136, 141, 143, 150  
 агрессия 113, 135  
 аллергия 78–79, 133  
 анатомия 12–17  
 антибиотики 134, 136  
 аппетит, потеря 23, 50–52, 54–55, 63, 113, 115, 150, 161  
 аптечка первой помощи 66–69, 105  
 атопический дерматит 79

## Б

банданы 118–119  
 беременность 102–103, 162–167  
   послеродовой уход 168–169  
   прерывистые роды 165, 166  
 бессознательное состояние 121, 122–125, 138–139, 146, 154  
 бешенство 26–27  
 блохи 47, 78  
 боль 35, 61, 63, 126  
   как распознать 112–115  
   как справиться 115  
   при мочеиспускании 144  
 ботулизм 156  
 бродячие кошки 179

## В

вакцинация 26–27, 176, 178  
 вес 42–45  
 видение в темноте 16  
 вирусные инфекции 156  
 влагилице 17  
 вода 14, 51  
 вой 35  
 вокализации 33, 34–35, 52, 71, 113–114  
 волдыри (от ожогов) 130  
 выделения из носа 23

вылизывание 15, 17, 47, 78, 142

## Г

гениталии 17, 144  
 герпесвирус, кошачий 26–27, 176  
 гипокальциемия 169  
 глаза 14, 16, 61, 80–81  
   как капать глазные капли 96–97  
   как промывать 69, 96  
   как распознать признаки боли 113, 114  
   как распознать признаки смерти 123  
   как распознать признаки шока 116  
 кровотечение 81, 140  
 чистка 96  
 язык тела 32–33  
 глисты 46  
 гнев, язык тела 33  
 гноеподобные выделения 129, 136, 137, 141  
 гнойничковые поражения кожи 79  
 грибковые инфекции 78  
 грибовидная форма 14

## Д

дегидратация 151  
 дезориентация 58, 61, 70  
 дерматиты 79  
 десны 18–23, 54, 61, 116–117, 146, 152, 161  
 дефекация 113, 115, 154, 180  
 диабет 176  
 диарея 46, 63, 152, 153, 161  
 домашние кошки 134  
 интеллектуальная стимуляция 28–31  
 когти 24

физическая нагрузка 45  
 дорожно-транспортные происшествия 138–143  
 дрессировка с кликером 37  
 дрожжевидный грибок 156  
 дрожь 58, 154, 169  
 дыхание 58–59, 63, 113, 115, 116, 126, 133, 138, 146, 149, 161  
 реанимация 122–125, 138  
 дыхательная система 59

## Е

елизаветинский воротник 77, 79, 84–85, 86, 143  
 как сделать 172–173

## Ж

живот, вздутие 46  
 жизненные показатели 58–59

## З

заболевания ротовой полости 18–23, 50, 54, 115  
 запах 16, 50–51  
   изо рта 23, 149  
 запор (констипация) 115  
 застрявшие кошки, как извлечь 82–83  
 землетрясение, подготовка 104–105, 108  
 змея, укусы 132–133  
 зубы 14, 18–23, 50, 54, 115, 126

## И

игрушки 30–31, 45, 118  
 игры 28–31, 45, 135  
 идентификационные метки 104  
 изменения поведения 64, 112–114  
 иммунная система 27, 51, 52  
 интеллектуальная стимуляция 28–31, 177

**К**

как обращаться с кошками 69, 70–73  
 приучение 7  
 калицивирус, кошачий 26–27, 176  
 кашель 63, 119, 146, 149  
 клещи 48–49, 67, 156  
 когтеточки 24, 31, 177  
 когти 12–13  
 вросшие 53  
 подрезание 24–25, 53  
 удаление 177  
 кожа 17  
 покраснение 79, 130  
 поражения 79, 130  
 конвульсии 63, 154–155  
 кормушка-головоломка 28–29  
 кости 12–13  
 в рационе 118, 120  
 переломы 70, 126–127, 138–139, 141  
 котят  
 вакцинация 26, 178  
 дегельминтизация 46  
 игровые бои 135  
 обучение 36–37  
 рацион 38  
 реанимация 170–171  
 роды и новорожденные 162–169  
 кровеносный сосуд ногтевой пластины 13, 25  
 кровотечение 63, 81, 136–143  
 кровь  
 в моче 144  
 в рвоте 152, 161  
 в стуле 46, 153, 161  
 купание кошки 98–101

**Л**

лазерная указка 30, 83

лактоза, непереносимость 14, 41  
 лапы 12–13  
 температура 116  
 травмы 142–143  
 у морды 119  
 лейкомия, кошачья 26–27, 176  
 лекарства 115  
 как дать кошке 88–97  
 хранение 89  
 лимфатические узлы 150  
 лихорадка 63, 129, 136, 141, 150–151  
 лоток 36, 53, 105, 115, 180

**М**

массаж 117  
 мастит, лечение 169  
 медицинские осмотры 7  
 метеоризм 46  
 микрочип 104, 179  
 мочевыводящие пути, заболевания 144–145  
 мочеиспускание 61, 63, 112–113, 115, 144–145, 154, 180  
 мурлыканье 35, 113, 114  
 мяуканье 34–35

**Н**

наводнение, подготовка 104–105, 107  
 намордник 69  
 настроение, изменения 112–114  
 нервы, повреждение 156  
 новогодние украшения 118  
 новорожденные котят  
 170–171  
 носилки 74

**О**

обморок 63, 116, 128, 132–133, 149

обучение 31, 36–37  
 общение 16, 32–35  
 ожирение 42–45  
 ожоги 63, 130–131, 149  
 опухоли 27, 150, 156  
 осколки 67  
 осмотр кошки 58–61, 70  
 остеоартрит 50, 52  
 отек в месте инъекции 27  
 отеки и опухоли 78, 113, 115, 126, 129, 132–133, 136, 137, 141  
 охотничье поведение 15, 28, 177  
 ошейник 104, 118–119

**П**

падение 63  
 в воду 63, 146–147  
 пальцы 12–13  
 паразиты 46–49, 78, 156, 177, 181  
 паралич 63, 156–157  
 паспорт домашнего животного 27  
 пена изо рта 119  
 penis 17  
 перевязочный материал 64, 69, 77, 86–87, 137  
 переломы 70, 126–127, 138–139, 141  
 переноска 36, 74–75, 104, 109, 122, 178  
 как сделать 174–175  
 питание 14–15, 38–45, 78, 118, 181  
 беременные кошки 103  
 вес и ожирение 42–45  
 пожилые кошки 53  
 после операции 85  
 потеря аппетита 23, 50–52, 54–55, 63  
 список опасной еды 41  
 ядовитая еда 161

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

пищеварительная система  
14–15, 46

подвижность, изменения  
113–114

подстилка 115

пожар, как подготовиться  
104–106

пожилые кошки

признаки старения 50–53  
рацион 38–39

поза 112–114

положительное подкрепление  
36–37

попискивание и вибрирующий  
звук 35

поражение 79, 130

послеоперационный уход  
84–85

потеря веса 46

походка 12, 61, 64, 70, 112, 114

почему кошка прячется 32, 104,  
113, 114

прием Геймлиха 121

признаки 7

проглатывание инородного  
предмета 63

пульс 58, 60, 63, 113, 115, 116, 121,  
123, 138

путешествия 27, 74–75

## Р

равновесие 16

рак 176

раны 64, 68–69

абсцессы 129, 134, 136, 141,  
143, 150

инфицированные 129, 136,  
141, 142–143, 150

кровотечения 136–143

обработка и перевязка 68–69,  
76–77, 87

от укусов 134–137

открытые переломы 127, 139  
послеоперационный уход  
84–85

различные травмы 138–141

рваные 141

резаные 141

травмы в драках 134–137

травмы лап 142–143

травмы хвоста 126–127, 141

уход после 86–87

растяжения 70

рвота 46, 58, 61, 63, 69, 133, 146,  
152, 161

позывы 119

реанимация 122–125, 138, 140

рот, открывание 90

рудиментарный коготь 12–13

рычание 35, 113, 114

## С

скелет 12–13, 126–127

слабоумие 35

СЛР / закрытый массаж сердца  
121, 123, 125

слух 16, 50–51

случайная травма 138–143

слюна 23, 161

слюноотделение 23, 119, 126,  
128, 149, 152, 154, 161

смерть, как распознать 123

сон, увеличение времени 113

соски 102–103

социальные навыки, развитие  
36, 135

старение, признаки 50–53

стерилизация 102, 135, 176, 178

стихийные бедствия,  
подготовка 104–109

страх, язык тела 33, 71

стресс и тревога 32, 54, 71, 76

судороги 63, 149, 154–155

«судорожный» рефлекс 154

## Т

температура 17, 58, 61, 116, 128,  
150–151

тепловая терапия 115

тепловой удар 128

точка у самки 35, 102–103

токсоплазмоз 156

таблеткодаватель 91

травмы 63, 138–143, 156–157

в драках 134–137

головы 63, 70, 73, 140

спины 70, 73, 74

третье веко 80, 81

трупное окоченение 123

тяжелое дыхание 128

## У

удар 156–157

электрическим током 63,  
148–149

удушие 118–121

укусы

пчел 132–133

животных 36, 114

животных и насекомых  
132–133, 156

уличные кошки 177

усы 16

опаленные 130

язык тела 33

уход 15, 50, 52–53, 78, 98

перемены 113–114

уши 16

как капать ушные капли  
94–95

ушные клещи 48

чистка 95

язык тела 32–33

**Ф**

физиотерапия 115  
 физическая нагрузка  
 42–45  
 физическая форма 61, 63  
 физраствор 68, 76, 80  
 фырканы 35

**Х**

хвост 16  
 вывих 127  
 перелом 126–127, 141  
 травмы 141  
 язык тела 32–33  
 химические ожоги  
 130–131  
 хламидиоз, кошачий 26–27,  
 176  
 хромота 61, 63, 142

**Ц**

царапанье 47, 48, 78, 114,  
 132

**Ч**

частота дыхания 58–59, 63,  
 113, 115, 116, 146  
 челюсть 14, 126

**Ш**

шарики шерсти 15, 118  
 шерсть 15, 52, 78–79  
 выстригание вокруг раны  
 67, 76  
 дыбом 33  
 зальсины 78  
 мытье шампунем 98–101  
 подпалины 130  
 сильная линька 78, 181  
 уход 79  
 шипение 33, 35

шок 74, 104, 116–117, 130,  
 137, 149  
 шторм, подготовка  
 104–105, 109

**Э**

эндометрит 169  
 энергичность, изменения  
 115, 116, 150  
 энтерит, кошачий  
 инфекционный 26–27, 176  
 эпилепсия 176

**Я**

ядовитые вещества 41, 63,  
 158–161  
 язык 14  
 тела 32–33  
 яички 17  
 Якобсонов орган 16



## БЛАГОДАРНОСТИ АВТОРА

Я хотела бы поблагодарить мою семью Монсеррат за поддержку и искренний энтузиазм на протяжении всего процесса написания этой книги. Особенно я благодарна Люку Джонсу, который был рядом со мной от начала до конца, преданно принося мне бесчисленные чашки чая. Спасибо моей матери Джо, сестре Джине и брату Джулиану за то, что они с самого раннего возраста страстно поощряли меня к осуществлению моей мечты — стать писателем. Благодарю также Эллен Харди за то, что она дала мне шанс и ввела меня в мир ветеринарной литературы.

Наконец, спасибо издательской команде Quarto, в частности Салли Мак-Каллум и Анджеле Спар, квалифицированным ветеринарным врачам, которые проверили правильность и актуальность рекомендаций.

## ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Издательство благодарит все агентства за разрешение на публикацию материалов, защищенных авторским правом:

### shutterstock.com

Happy Author: 3, 64, 86, 137;  
 KDdesignphoto: 4, 101; Constantin Iosif: 5, 149, 157; PolinaBright: 6; New Africa: 6, 66, 105; Ondacaracola: 7; Beatriz Vera: 7, 62; Sonesdska Yulija: 9, 21, 24, 143, 160, 184; Alexander\_P: 12, 14, 15, 59, 60, 126, 150; gritsalak karalak: 13; KOKTARO: 13, 16, 131, 141, 142; Chris Soucy: 14; Robynrg: 15; Elisa Putti: 16; oksana2010: 16; tranac: 16; Kucher Serhii: 17; Margo Harrison: 17; Rainer Lesniewski: 18; Csaba Vanyi: 19; Maryia\_K: 19; zawafoto: 19; yod67: 21, 22, 49, 59, 68, 69, 88, 95, 97, 99; Picsfive: 21, 88; Abigail Crawford: 22; Sergij Baibak: 22; ekkapon: 22, 40; Pongsak A: 23; Toa55: 23; TungCheung: 23; Elya Vatel: 24; Mylimages - Micha: 24, 31, 83; Africa Studio: 26, 31, 36, 38, 75, 90, 140, 145, 151, 159, 180, 187; Maximilian100: 27; metha1819: 27; Studio Ayutaka: 27; Benjamin Simeneta: 28; Gabbmiester: 28; Kasefoto: 28; Pavel Vinnik: 28, 39; Agata Kowalczyk: 29; jessjeppe: 29; Suzanne Tucker: 30, 119; Nils Jacobii: 30, 149, 152, 177, 179; Antonsov85: 30, 83; Eric Isselee: 31, 34, 35, 91, 93, 153, 159; Krissi Lundgren: 32; Lux Blue: 32; Guitarfoto studio: 33; shymar27: 33; Usacheva Ekaterina: 34; eremeevdv: 35; cynoclub: 36, 50, 99, 134; Dora Zett: 37; Okssi: 38, 152; Mark\_KA: 39, 55; Sergiy Kuzmin: 40; Jiri Hera: 40, 44; cristi180884: 41; Mark stock: 41, 45, 48, 61, 63, 65, 72, 77, 89, 93, 98, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 147, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 161, 164, 181; Dennis van de Water: 42; Yatsenko Alexey: 43; ElenaShow: 43, 103, 150, 173; Ermolaev Alexander: 44, 52, 64, 69, 78, 80, 93; atiger: 45; Sari ONeal: 45; Isis Medri: 46; Todorean-Gabriel: 46, 48, 145; nevodka: 46, 92, 177; Francesco Scotto di Vetta: 47; Usagi-P: 47; Vera Larina: 47; Vitalij Martynko: 47; Chanisa Ketbumrung: 48; Mariyana M: 49; Sandra Huber: 49, 67; studiovin: 49, 68, 69, 95, 97, 105; Konstantin Aksenov: 52; Denis Val: 53, 100; PRESSLAB: 54; Cattlaya Art: 55; PERLA BERANT WILDER: 55; Yellow Cat: 55, 124; ALEX S: 55, 153; Suradech Prapaiart: 55, 153; prachyaloyfar: 56; Denis Tabler: 58; Steve Heap: 59; Akarat Phasura: 60; Noel V. Baebler: 60; elenabsl: 60, 120, 121; dezy:

61; Katho Menden: 63; Tom Wang: 63; Sviatlana Barchan: 65; kovalvl: 67; nito: 67; Viktoria Gavrilina: 67, 131; Passakorn Sakulphan: 67; Sanit Fuangnakhon: 67, 99; Gruffi: 68; prapass: 68; premkh: 68; 168 STUDIO: 68, 151; Regreto: 68, 95, 97; Oliver Wilde: 68, 97; Angelika Smile: 69, 87; Early Spring: 69, 87; Elena Elisseeva: 69, 87; Angel photographer: 71; schankz: 71, 124; frantico0: 74, 178; Bulltus\_casso: 75; Chomphuphucar: 77; Ameena Matcha: 78; Miroslav Pesek: 78; Elena1: 79; Muanpare Wanpen: 79; Tatiana Chekryzhova: 79; Designua: 80; Maria Sbytova: 81, 162; Prilutskiy: 82; T.Den\_Team: 83; maxsattana: 84; Mariia Boiko: 85; aperturesound: 86; Viktorija Hnatiuk: 87; Catherine Murray: 88; Pakhnyushchy: 89; Pixel-Shot: 89, 101; Akifyeva S: 91; StockPhotoAstur: 92; Andriy Blokhin: 93; Kristi Blokhin: 95; PixieMe: 96; 135pixels: 98; agolndr: 99; Dmitriy Lukyaynov: 99; goir: 99; Swapan Photography: 99; tanuha2001: 99; alisamorus: 100; Levent Konuk: 102; Neonci: 102; Oleksandr Lytyvnyenko: 102, 162; Lightspruch: 103, 122; Alekseykolotvin: 105; Anton Starikov: 105; VAKS-Stock Agency: 106; Land\_of\_Arion: 107, 146; Wil Setias Dizon: 108; Alan LeStourgeon: 109; ANURAK PONGPATIMET: 109, 163; Maliwan Prangpan: 110; Susan Schmitz: 113, 178; Mila Moskovskaya: 114; g215: 116; happymay: 116; Kachalkina Veronika: 116, 170; kou2341: 118; PhotoStockPhoto: 118; Butus: 119; SUSAN LEGGETT: 119; krumanop: 123; Nitiphonphat: 125; M. Sam: 127; Tanakorn Akkarakulchai: 127; Julija Kumpinovic: 128; Paul\_Brighton: 128; supanee sukanakintr: 129; AnkaFed: 130; I am a Stranger: 131; Irina Kozorog: 132; Lethabo Joy: 133; PERO studio: 133; Tony Campbell: 135; DavidTB: 136; F\_N: 138; Natalia Pyzhova: 139; jooh: 142; sg19803: 142; TheRocky41: 144; Kalcutta: 146; THANYA24: 148; FLUKY FLUKY: 151; Hanna\_photo: 151; Tim UR: 153, 159; C.PIPAT: 154; fotofree: 155; Lilia Solonari: 156; McGraw: 156; Morrowind: 157; Tomnamon: 157; Natalya Chumak: 158; akepong srichaichana: 159; Artem Kutsenko: 159; Lucky Business: 159; MaraZe: 159; Mega Pixel: 159; Moving Moment: 159; Rob Hyrons: 159; Roman Samokhin: 159; Sivaan: 159; virtu studio: 159; Zeeking: 159; AZir: 160; domnitsky: 160; Evgeny Karandaev: 160; kamnuan:

160; Richard Griffin: 160; MirasWonderland: 161; NikolaJuricPhotography: 163; Vetlifer: 163; PardoY: 164, 165; Yuttana Joe: 164, 165; Kotomiti Okuma: 166; Leonid and Anna Dedukh: 168; RamonaS: 171; AMMLERY: 172; Jamesbin: 173; Mallinka1: 173; Yulia Glam: 173; Lario: 174; tanumporn: 175; Anna Mitrohina: 176; KANOWA: 181; vandycan: 181; MelnikovS: 192;

### gettyimages.com

Johner Images: 143

### unsplash.com

Zoltan Tasi: 2; Kevin Knezic: 10; Uriel Soberanes: 105; Calum Lewis: 182

### other

Ru Lanaway 126. 🐾  
 Sam Angus (Artwork model). 🐾

Издатели предприняли все усилия для получения разрешения на использование материалов, защищенных авторским правом. Мы приносим свои извинения за возможные ошибки или упущения и с благодарностью внесем все исправления в последующие переиздания в случае уведомления.

## Первая помощь

# КОШКАМ

Как понять, что моя кошка заболела? Можно ли помочь ей в домашних условиях или нужно бежать к врачу? Как правильно ухаживать за ней, чтобы она оставалась здоровой и активной?

Ежедневно владельцы кошек сталкиваются со множеством вопросов о своем питомце. «Первая помощь кошкам» избавит от приступов паники в непонятной ситуации, объяснив, когда стоит незамедлительно посетить ветеринара, а с чем можно справиться самостоятельно.

Вы узнаете, как спасти кошку, если она подавилась или захлебнулась, и что положить в аптечку первой помощи; научитесь перевязывать небольшие раны, вытаскивать клещей и давать питомцу лекарство. В книге есть как пошаговые сценарии действий в экстренных случаях, так и советы о регулярном уходе за питомцем: стрижке когтей, чистке зубов, выборе подходящего корма и профилактике болезней.

**Дженнифер Паркер** изучала зоологию, восстановление исчезающих видов и палеоантропологию в Великобритании, получила степени бакалавра и магистра, училась в аспирантуре и в течение трех лет работала ведущим редактором журнала «Ветеринарная практика».

«Книга написана с любовью к котикам и вниманием к комфорту владельцев. Здесь нет советов по самолечению — только четкие и понятные инструкции, при этом в книге рассмотрены все вопросы жизнедеятельности кошек — от кормления до сердечно-легочной реанимации. Мы все проходили в школе предмет ОБЖ, но там речь шла о людях, и здорово, что появилась книга о "безопасности жизнедеятельности" для кошек, ведь наши пушистые друзья очень отличаются от людей, но также заслуживают спасения».

*Евгения Рязанова, вет-ассистент adoption-центра  
для кошек «Муркоша», [murkosha.ru](http://murkosha.ru)*



9 785001 950097